

Laboratorio **Dr. Barba**

Catálogo de servicios

LABORATORIO Dr. BARBA

C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)

Tel.: 91 364 58 35

Fax: 91 365 88 21

Catálogo de servicios

TABLA DE CONTENIDOS

Información general.....	2
Información sobre el catálogo.....	2
Pruebas no incluidas en el catálogo.....	2
Valores de referencia.....	2
Asesoramiento para la interpretación de los resultados.....	2
Alta como cliente.....	2
Envío de muestras.....	2
Material de embalaje, material para toma de muestras y formularios de solicitud de pruebas.....	2
Perfiles.....	3
Pruebas por orden alfabético.....	29

Catálogo de servicios

INFORMACIÓN GENERAL

Información sobre el catálogo

El catálogo de pruebas de laboratorio puede consultarse en <https://www.lbbarba.es> en su área de cliente. Aunque se hace todo lo posible para mantener actualizado el Catálogo de Pruebas de Laboratorio, la copia electrónica que se encuentra en su área de cliente es el documento válido.

Pruebas no incluidas en el catálogo

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbarba.es

Valores de referencia

Los valores de referencia e información sobre la interpretación se comunica con los resultados de las pruebas.

Asesoramiento en la interpretación de los resultados

Disponemos de un equipo de profesionales especializado en la interpretación de análisis de pequeños y grandes animales. Las consultas pueden dirigirse al 913645835 (opción 4) o a clientes@lbbarba.es

Alta como cliente

Puede darse de alta como cliente en <https://www.lbbarba.es> , en el 913645835 o en clientes@lbbarba.es

Envío de muestras

Se puede solicitar a través de <https://www.lbbarba.es> , en su área de cliente o en el 913645835.

Material de embalaje, material para toma de muestras y formularios de solicitud de pruebas

Se pueden solicitar o descargar a través de <https://www.lbbarba.es> , en su área de cliente o en el 913645835.

Se recomienda usar nuestro material de embalaje para el envío de muestras, ya que cumple la norma UN3373 para transporte de material biológico de categoría B.

Catálogo de servicios

Perfiles

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbbarba.es

Aborto bovino, perfil (Brucella rosa de bengala, IBR PCR, BVD PCR, Neospora PCR, Leptospira PCR, Campylobacter PCR, Tritrichomonas foetus PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml y placenta

Plazo (días): 5

Aborto caprino y ovino, Perfil (Brucelosis Rosa Bengala, Clamidiasis Ac, Fiebre Q Ac, Campylobacter PCR, Salmonella PCR, Listeria Ac, Listeria PCR, Neospora PCR, Toxoplasma PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y placenta o tejido fetal (hígado y pulmón)

Plazo (días): 5

Aborto Equino, Perfil (Herpesvirus equino PCR Leptospirosis PCR Arteritis Equina PCR Salmonella PCR con sonda ADN)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y placenta

Plazo (días): 7

Aborto Felino, Perfil (Cultivo, Mycoplasma PCR, Herpesvirus PCR, Paleucopenia PCR, Toxoplasma PCR, Tritrichomonas PCR y Campylobacter PCR)

Instrucciones: 2 Hisopos vaginales con medio transparente o sin medio

Plazo (días): 5

Aborto perinatal canino, perfil (Ac IgG Toxoplasma, Neospora y Brucella, PCR en hisopo vaginal de Mycoplasma, Campylobacter, Moquillo, Parvovirus y Herpesvirus, cultivo de E. coli en hisopo vaginal)

Instrucciones: suero (0.5 ml) e hisopo vaginal o prepucial con medio sin carbón (3 hisopos)

Plazo (días): 5

Asma Felino, perfil (Citología, Cultivo, Parásitos y Mycoplasma PCR de lavado bronquial, Parásitos en heces e IgE total en plasma)

Instrucciones: Lavado bronquial y heces

Plazo (días): 5

Aviar basico, perfil (ácido úrico, LDH, GOT, CPK, glucosa, proteínas totales, calcio, colesterol, ácidos biliares, fósforo)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Perfiles

Aviar completo, perfil (ácido úrico, LDH, CPK, glucosa, proteínas totales, calcio, colesterol, ácidos biliares, fósforo, GOT, triglicéridos, sodio, potasio, amilasa, proteinograma)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Babesia y Anaplasma, Perfil (PCR, uso en bovino)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 5

Babesia y Anaplasma, Perfil (PCR, uso en equino)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 5

Barf, Perfil (Hemograma, Calcio, Fósforo, Cobre, Zinc, Vitamina A, Vitamina D3, Albúmina, Creatinina, Proteínas totales, GPT (ALT))

Instrucciones: EDTA(1ml) y suero centrifugado (2ml) y 6ml sangre en tubo tapón blanco. Invertir 5-10 veces y poner el tubo en posición vertical hasta que coagule totalmente(60 min mín).Centrifugar 3000rpm 10 min y transferir sobrenadante al tubo tapón amarillo.Solicitar

Plazo (días): 10

Básico, perfil + Ehrlichia IgG

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero

Plazo (días): 1

Básico, perfil + leish can elisa

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Básico, perfil + leishmania IFI

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero

Plazo (días): 1

Básico,perfil con SDMA

Instrucciones: sangre con EDTA(0,5ml) y suero (1 ml)

Plazo (días): 4

Catálogo de servicios

Perfiles

Básico. Perfil, Leishmaniosis IFI y Leishmaniosis PCR

Instrucciones:

Plazo (días): 3

Coagulación, Perfil (Tiempo de Protrombina, Tiempo de Trombina, APTT, Fibrinógeno y Factor Von Willebrand conc canino)

Instrucciones: plasma citratado

Plazo (días): 3

Complejo Respiratorio canino, Perfil (Adenovirus PCR, Parainfluenza PCR, Herpesvirus PCR, Bordetella PCR, Mycoplasma PCR)

Instrucciones: 2 hisopos con medio Stuart o Amies y 1 hisopo sin medio

Plazo (días): 1

Complejo Respiratorio Felino, Perfil

Instrucciones: 2 Hisopos (sin medio o medio transparente) nasales y/o faríngeos

Plazo (días): 5

Completo, perfil + leish can ELISA

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero

Plazo (días): 1

Completo, perfil + leishmania IFI

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero

Plazo (días): 1

Coprológico ave, perfil (Parásitos, Cultivo y Tinción de Gram)

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 3

Diabetes, Perfil (Hemograma, Urea, Creatinina, Glucosa, Fructosamina, Insulina, HOMA-IR, Triglicéridos, Sistemático de orina, Proteínas en orina, Creatinina en orina, Ratio Proteína/Creatinina en orina, Urocultivo)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) , suero (1 ml) y orina (2 ml)

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Perfiles

Diarrea felino, perfil (real time PCR Clostridium perfringens , Cryptosporidium spp ., Coronavirus felino , virus Panleucopenia felina , Giardia spp . , T oxoplasma gondii , Tritrichomonas foetus, Campylobacter spp. y Salmonella spp .)

Instrucciones: heces

Plazo (días): 5

Ehrlichia-Rickettsia-6 Bioquímicas a elegir, de precio igual o inferior a 4 euros, Perfil

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

FeLV + FIV (pruebas independientes)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Gastrointestinal Crónico completo Canino, Perfil (Hemograma, Creatinina, GOT, GPT, Proteínas totales, Fosfatasa alcalina, Albúmina, Globulinas, Cociente A/G, Glucosa, Folatos, Cobalamina, Triglicéridos, SDMA, Cloro, Sodio, Potasio, Ratios Na/K, Clcio, Fós

Instrucciones: Edta y suero

Plazo (días): 7

Gastrointestinal Crónico completo Felino, Perfil (Hemograma, Creatinina, GOT, GPT, Proteínas totales, Fosfatasa alcalina, Albúmina, Globulinas, Cociente A/G, Glucosa, Folatos, Cobalamina, Triglicéridos, SDMA, TLI felina, Colesterol, Proteína C reactiva)

Instrucciones: Edta y suero

Plazo (días): 7

Geriátrico canino completo + Índice de Neoplasia

Instrucciones: sangre con EDTA y suero

Plazo (días): 1

Hemograma y 10 pruebas bioquímicas de precio igual o inferior a 4 euros

Instrucciones: suero y sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA

Plazo (días): 1

Hemograma y 4 pruebas bioquímicas de precio igual o inferior a 4 euros

Catálogo de servicios

Perfiles

Instrucciones: suero y sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA

Plazo (días): 1

Hipotiroidismo autoinmune canino, Perfil (Ac anti T3 y Ac anti T4)

Instrucciones: suero (1 ml)

Plazo (días): 20

Iguana, perfil (ácido úrico, GOT, glucosa, proteínas totales, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Inmunitario canino, perfil (Ac IgG frente a Moquillo, Parvovirus, Hepatitis infecciosa y Leptospirosis)

Instrucciones: sangre, plasma o suero (0.5 ml)

Plazo (días): 1

LCR, perfil (cultivo, citología, conteo celular y proteínas)

Instrucciones: LCR

Plazo (días): 5

Leishmania completo con Leishmania por PCR, perfil

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y suero (0.5 ml)

Plazo (días): 3

Leishmania PCR + Leishmania IFI

Instrucciones: sangre con EDTA y suero. Muestras de tejido preferentemente sin formol o bloque de parafina

Plazo (días): 3

Leishmania+Ehrlichia+Filaria

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Leishmania+Ehrlichia+Proteinograma

Instrucciones: suero

Plazo (días): 2

Catálogo de servicios

Perfiles

Leishmaniosis + Ehrlichiosis

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Leishmaniosis + Ehrlichiosis+6 bioquímicas de precio igual o inferior a 4 euros

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Leishmaniosis básico, perfil (IFI de leishmania, creatinina, GPT, proteínas totales, albúmina, globulinas, cociente albúmina/globulinas)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Leishmaniosis completo, perfil (Hemograma, IFI de leishmania, urea, creatinina, GPT, proteinograma, Proteína C reactiva)

Instrucciones: suero y sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA

Plazo (días): 2

Leishmaniosis completo, perfil con SDMA

Instrucciones: .

Plazo (días): 4

Líquido ascítico, pleural u otros (cultivo, extensión, conteo celular y bioquímica)

Instrucciones: Se necesita un mínimo de 1 mL de muestra

Plazo (días): 2

Locus S Canino - White Spotting

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Labrador retriever

Metabólico equino, Perfil

Instrucciones: sangre con EDTA y suero

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Perfiles

Metabólico-Neurológico, Perfil

Instrucciones: sangre con EDTA y suero centrifugado (0.5 ml)

Plazo (días): 2

Neurológico equino, perfil (Herpesvirus tipo 1 Ac, Clostridium spp. Ac, Virus del Nilo PCR)

Instrucciones: suero y sangre con EDTA

Plazo (días): 5

Neurológico felino 1, perfil (PCR Real Time de: Toxoplasma, PIF, Cryptococcus, Panleucopenia, Bartonella, FeLV e Inmunodeficiencia)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml o Tejido

Plazo (días): 5

Neurológico hurón, perfil (Moquillo PCR, enfermedad aleutiana PCR, ratio insulinemia:glicemia, Cryptococcus PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) , suero (0.5 ml) y orina (5 ml)

Plazo (días): 4

Ocular felino completo, Perfil (Herpesvirus PCR, Chlamydomphila IgG, Bartonella PCR, PIF PCR, FeLV PCR, Mycoplasma PCR, Leishmania IgG, Toxoplasma IgG, Calicivirus PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y dos hisopos conjuntivales (sin medio o medio transparente)

Plazo (días): 5

Ocular felino, Perfil (Herpesvirus PCR, Chlamydomphila PCR, Mycoplasma PCR, Calicivirus PCR)

Instrucciones: Escobillón ocular

Plazo (días): 5

Ovino y Caprino, Perfil Infecciosas (Brucelosis Ac, Tuberculosis PCR, Listeria Ac, Clostridium cultivo, Salmonella PCR, Pasteurella PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA, suero y heces (TODAS)

Plazo (días): 7

Pack 1 cavalier King Charles spaniel: Episodic falling (EF), síndrome dry eye curly coat (CCS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack 1 Russell terrier: Enfermedad cerebral juvenil (JBD), ataxia de aparición tardía (LOA), ataxia espinocerebelar (SCA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Russell terrier

Pack 2 cavalier King Charles spaniel: Distrofia muscular (MD), episodic falling (EF), macrotrombocitopenia (MTC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), síndrome dry eye curly coat (CCS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Pack 2 Russell terrier: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), ataxia de aparición tardía (LOA), ataxia espinocerebelar (SCA), enfermedad cerebral juvenil (JBD), luxación primaria de lente (PLL)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Russell terrier

Pack American bully: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA), cistinuria, hiperuricosuria (HUU/SLC), lipofuscinosis neuronal cerioide (NCL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: American bully

Pack American Staffordshire terrier: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA) lipofuscinosis neuronal cerioide (NCL), mielopatía degenerativa (DM exón 2), D-locus d1 (dilución)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: American Staffordshire terrier

Pack Basenji: Atrofia progresiva de retina (Bas-PRA1), deficiencia de piruvato quinasa (PK), síndrome de Fanconi

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Basenji

Pack bengalí: Grupo sanguíneo genético, atrofia progresiva de retina (b-PRA), atrofia prog deficiencia de piruvato quinasa (PK)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Catálogo de servicios

Perfiles

Plazo (días): 15

Razas: Bengala

Pack birmano: Grupo sanguíneo genético, hipotricosis, mucopolisacaridosis tipo 6 (MPS6), enfermedad renal poliquística (PKD), atrofia progresiva de retina (pd-PRA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Birmano

Pack bobtail: Ataxia hereditaria (HA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), disquinesia ciliar primaria (PCD), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a ivermectina (MDR1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bobtail

Pack Bolonka Zwetna: Atrofia progresiva de retina (cord1-PRA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), D-locus d1 (dilución), furnishing

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bolonka zwetna

Pack border collie: Síndrome de Raine, anomalía ocular del collie (CEA), glaucoma y goniodisgenesis (GG), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), sensibilidad a la ivermectina (MDR-1), síndrome Imlerslund-Gräsbeck (IGS), síndrome del neutrófilo atrapado (TN)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Border collie

Pack bosque de Noruega: Grupo sanguíneo genético, enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo 4 (GSD4), deficiencia de piruvato quinasa (PK), ámbar

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bosque de Noruega

Pack boyero australiano: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (rcrd4-PRA), cistinuria, lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), luxación primaria de lente (PLL), mielopatía degenerativa

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Perfiles

Razas: Boyero australiano

Pack British de pelo corto: Grupo sanguíneo genético, síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS), enfermedad renal poliquística (PKD), Hipotiroidismo Congénito Felino, Cardiomiopatía hipertrófica felina HCM4

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: British shorthair, British longhair

Pack bull terrier: Parálisis laríngea (LP), acrodermatitis letal (LAD), luxación primaria de lente (PLL)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bull terrier

Pack bulldog francés: Catarata hereditaria (HSF4), condrodisplasia y condrodistrofia (CDPA & CDDY, IVDD risk) cistinuria, hipotiroidismo congénito (CHG), mielopatía degenerativa (DM exón 2), retinopatía multifocal (CMR1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bulldog francés

Pack bulldog: Cistinuria, hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), retinopatía multifocal canina (CMR1), síndrome Robinow-like (DVL2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Antiguo bulldog inglés, Bulldog continental, Bulldog francés, Bulldog inglés

Pack burmés: Grupo sanguíneo genético, gangliosidosis (GM2), defecto craneal, hipopotasemia

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Burmes

Pack cairn terrier: Deficiencia de piruvato quinasa (PK), leucodistrofia de células globoides (Krabbe disease), macrotrombocitopenia (MTC), osteopatía craneomandibular (CMO)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Cairn terrier

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack caniche: Atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA y prcd-PRA), encefalopatía neonatal (NEWS), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD-1), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Caniche

Pack carlino: Deficiencia de piruvato quinasa (PK), hipertermia maligna (MH), luxación primaria de lente (PLL), meningoencefalitis necrotizante (NME/PDE), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Carlino

Pack chihuahua: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), crd-PRA (crd4-PRA), crd4-MAP9 y Enfermedad de Lafora

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Chihuahua

Pack cobrador de pelo rizado: Atrofia progresiva de retina (cord1-PRA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), enfermedad por almacenamiento de glucógeno (GSDIIIa), mielopatía degenerativa (DM Exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Curly coated retriever

Pack cocker spaniel: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), nefropatía familiar (FN), síndrome mutilación acral (AMS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Cocker spaniel inglés

Pack collie: Anomalia ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (rcd2-PRA), enfermedad pulmonar inflamatoria (IPD), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a la ivermectina (MDR-1), dermatomiositis (DMS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Collie

Pack colores de capa bengala: Charcoal, chocolate, cinnamon, diluido, snow

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bengala

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack colores de capa gato: Agouti, chocolate, canela, colourpoint, diluido, siamés, burma

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas, Bengala, Maine coon, Birmano, Ragdoll, British shorthair, British longhair, Siamés, Oriental de pelo corto, Persa, Devon rex, Sphynx, Bosque de Noruega, Siberiano, Burmes

Pack Continental Toy Spaniel: Atrofia progresiva de retina (pap-PRA1), deficiencia del factor VII (F7), distrofia neuroaxonal (NAD), mielopatía degenerativa (DM exon 2), von Willebrand tipo 1 (vWD-1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Papillón

Pack crestado chino: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd3-PRA), degeneración sistémica múltiple canina (CMSD), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), luxación primaria de lente (PLL), mielopatía degenerativa (DM exón)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Perro crestado chino

Pack Devon Rex: Grupo sanguíneo genético, síndrome miasténico congénito (SMC), longitud de pelo (pelo corto/pelo largo), variante de pelo sphynx / Devon rex (SPH/DRX)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Devon rex

Pack dóberman: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), narcolepsia, enfermedad de von-Willebrand tipo 1 (vWD-1), B-locus (marrón, chocolate, hígado), D-locus (dilución)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Doberman

Pack Fox terrier: Ataxia espinocerebelar (SCA), hipotiroidismo congénito (CHG), luxación primaria del cristalino (PLL), síndrome de van den Ende-Gupta (VDEGS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Fox terrier

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack golden retriever: Atrofia progresiva de retina (GR-PRA1, GR-PRA2 y prcd-PRA, distrofia muscular (MD), ictiosis (tipo 1 y 2), lipofuscinosis neuronal cerioide (NCL)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Pack Gordon setter: Ataxia hereditaria (HA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), lipofuscinosis neuronal cerioide (NCL)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Gordon setter

Pack gran boyero suizo: Hemorragia postoperatoria (P2Y12), hipertermia maligna (MH), hiperuricosuria (HUU/ SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), D-locus (d1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Gran boyero suizo

Pack Kromfohrlander: Enfermedad de von Willebrand tipo I (vWD1), hiperqueratosis digital (DH/HFH), hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), variante del gen MDR1 (hipersensibilidad a la ivermectina), Furnishing

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Kromfohlander

Pack Landseer: Cistinuria, distrofia muscular (MD), D-locus d1 (dilución), mielopatía degenerativa (DM exón 2), trombopatía

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 10

Razas: Landseer

Pack Leonberger: Parálisis laríngea con polineuropatía tipo 3 (LPPN3), leucoencefalomielopatía (LEMP), polineuropatía del leonberger 1 y 2 (LPN1 y LPN2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Leonberger

Pack maine coon: Grupo sanguíneo genético, deficiencia del factor XI (F11), miocard deficiencia de piruvato quinasa (PK), atrofia muscular espinal (SMA)

Catálogo de servicios

Perfiles

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Maine coon

Pack pastor australiano y pastor americano miniatura: Anomalía ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), braquiuria, catarata hereditaria (HSF4), hiperuricosuria (HUU/SLC), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), mielopatía degenera

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Pastor australiano, Pastor americano miniatura

Pack pastor belga/holandés: Atrofia del SNC con ataxia cerebelosa (CACA), cardiomiopatía con mortalidad juvenil (CJM), degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 1 (SDCA1), degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 2 (SDCA2), mielopatía degen

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga, Pastor holandés

Pack pastor blanco suizo: Defecto MDR1 (hipersensibilidad a la ivermectina), enanismo hipofisario,mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Pastor blanco suizo

Pack pastor de Shetland: Anomalía ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (BBS2-PRA), atrofia progresiva de retina (CNGA1-PRA), enfermedad de von Willebrand tipo 3 (vWD3), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a ivermectina (MDR-1

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: pastor de Shetland

Pack perro cobrador de Nueva Escocia: Anomalía ocular del Collie (CEA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA),condrodisplasia (CDPA) y condrodistrofia (CDDY) (riesgo de IVDD), degeneración cerebelosa y miositis (CDMC), labio leporino/ paladar hendido y

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Perro cobrador de Nueva Escocia

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack Perro de agua francés: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD1), D-Locus d1 (dilución), K-Locus

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Perro de agua irlandés

Pack perro de aguas español: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (eo-PRA), braquiuria, distrofia neuroaxonal (NAD), hipotiroidismo congénito (CHG), mielopatía degenerativa (DM exón 2), Hiperuricosuria (HUU)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Perro de agua español

Pack perro de aguas portugués: Atrofia progresiva de retina de aparición temprana (eo-PRA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), gangliosidosis (GM1), improper coat

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Perro de agua portugués

Pack persa: Grupo sanguíneo genético, alfa-manosidosis (AMD), enfermedad renal poliquística (PKD), atrofia progresiva de retina (pd-PRA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Persa

Pack pointer alemán de pelo corto: Enfermedad de von Willebrand tipo 2 (vWD 2), epidermolisis bullosa juntural (JEB), lupus eritematoso exfoliativo cutáneo (ECLE), síndrome de mutilación acral (AMS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Braco alemán de pelo corto

Pack pomerania: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA), mucocoele biliar, raquitismo vitamina D dependiente (VDR)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Pomerania

Pack ragdoll: Grupo sanguíneo genético, miocardiopatía hipertrófica (HCM1, HCM3), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD1), atrofia progresiva de retina (pd-PRA)

Catálogo de servicios

Perfiles

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Ragdoll

Pack retriever de la bahía de Chesapeake: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Retriever de la bahía de Chesapeake

Pack rhodesian ridgeback: Mielopatía degenerativa (DM exón2), hemofilia B (deficiencia de factor IX), sordera hereditaria (EOAD), epilepsia juvenil mioclónica (JME), B-locus (hígado (nariz)), D-locus d1 (dilución)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Rhodesian ridgeback

Pack rottweiler: Leucoencefalomielopatía (LEMP), mielopatía degenerativa (DM exón 2), distrofia neuroaxonal (NAD), miopatía ligada al cromosoma X (XL-MTM), parálisis laríngea juvenil y polineuropatía (JLPP), longitud del pelo I (pelo corto/pelo largo)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Rottweiler

Pack schnauzer gigante: Atrofia progresiva de retina (NECAP1-PRA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), cardiomiopatía dilatada (DCM), hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Schnauzer gigante

Pack schnauzer mini: Neuropatía Charcot-Marie-Tooth (CMT), sensibilidad al complejo Mycobacterium avium (MAC), miotonía congénita, síndrome conducto mülleriano persistente (PMDS), atrofia progresiva de retina (tipo B1-PRA, HIVEP3), disostosis espondilocos

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

Pack Setter Inglés: crd4-PRA, crd4-MAP9 y Lipofuscinosis Neuronal Ceroide 8 (NCL8)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Catálogo de servicios

Perfiles

Plazo (días): 7

Razas: Setter inglés

Pack setter irlandés (rojo y blanco): Atrofia progresiva de retina (rcd1-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), deficiencia de adhesión leucocitaria (CLAD), leucodistrofia de células globoides (Krabbe)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Setter irlandés

Pack shiba inu: GM1-Gangliosidosis (GM1), GM2-Gangliosidosis (GM2), A-locus, E-locus

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Shiba inu

Pack siamés/oriental: Grupo sanguíneo genético, gangliosidosis (GM1), mucopolisacaridosis tipo 6 (MPS6), glaucoma congénito primario (PCG), atrofia progresiva de retina (rdAc-PRA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Siamés, Oriental de pelo corto

Pack siberiano: Grupo sanguíneo genético, deficiencia de piruvato quinasa (PK), colourpoint, dilución

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Siberiano

Pack soft-coated wheaten terrier irlandés: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), hiperuricosuria (HUU/SLC), microftalmia (RBP4), disquinesia paroxisomal (PxD), nefropatía perdedora de proteínas (PLN)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Irish soft-coated wheaten terrier

Pack Teckel: Osteogénesis imperfecta, Atrofia progresiva de retina PRA crd4 y PRA crd, Lipofuscinosis neuronal ceroides 2 (NCL2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Teckel

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack terrier negro ruso: Hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM Exon 2), parálisis laríngea y polineuropatía (JLPP)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 10

Razas: Terrier negro ruso

Pack terrier tibetano: Atrofia progresiva de retina (PRA3), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), enanismo pituitario, lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), luxación primaria de lente (PLL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Tibetan terrier

Pack vizsla: Abiotrofia cerebelosa cortical neonatal (NCCD), lupus eritematoso cutáneo exfoliativo (ECLE), mielopatía degenerativa (DM exón 2), longitud de pelo I (pelo largo o corto), furnishing

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Vizsla

Pack weimaraner: Disrafismo espinal (NTD), hipomielinización (síndrome del cachorro temblador) (SPS), mielopatía degenerativa (DM Exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Weimaraner

Pack Welsh corgi: Atrofia progresiva de retina (rcd3-PRA), braquiuria, enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD-1), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Corgi galés de Pembroke

Pack Yorkshire terrier: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), condrodisplasia y condrodistrofia (CDPA y CDDY, riesgo IVDD), encefalopatía necrotizante subaguda (SNE). L-2-hidroxiglutaraciduria (L-2-HGA), luxación primaria del cristalino (PLL)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Yorkshire terrier

Catálogo de servicios

Perfiles

Pancreático canino, perfil (Hemograma, amilasa, lipasa, glucosa, calcio, urea, triglicéridos, colesterol, almidón fecal, grasa fecal, digestión de proteínas, pH fecal, tripsina fecal, Vitamina B12, Ácido Fólico, PLI canina)

Instrucciones: sangre con EDTA, suero en ayunas y heces

Plazo (días): 3

Pancreático completo canino, perfil (Hemograma, amilasa, lipasa, glucosa, calcio, urea, triglicéridos, colesterol, almidón fecal, grasa fecal, digestión de proteínas, pH fecal, tripsina fecal, TLI en suero, Vitamina B12, Ácido Fólico, PLI canina, Proteína

Instrucciones: sangre con EDTA, suero en ayunas y heces

Plazo (días): 7

Pancreático completo felino, perfil (Hemograma, amilasa, lipasa, glucosa, calcio, urea, triglicéridos, colesterol, almidón fecal, grasa fecal, digestión de proteínas, pH fecal, tripsina fecal, TLI en suero, Vitamina B12, Ácido Fólico, PLI felina, Proteín

Instrucciones: sangre con EDTA, suero en ayunas y heces

Plazo (días): 10

Perfil Anticuerpos vacunales felino

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Perfil Diagnostico Insulinoma

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Perfil diarrea canino (real time PCR Distemper, Coronavirus, Parvovirus, Clostridium perfringens , Cryptosporidium spp ., Giardia spp . y Salmonella spp .)

Instrucciones: heces

Plazo (días): 5

Perfil diarrea rumiantes en heces(Parásitos, Rotavirus, Coronavirus, Cryptosporidium parvum, Salmonella PCR con sonda ADN, Escherechia coli, Clostridios, Giardia sp. antígeno, coccidios, Campylobacter spp. PCR)

Instrucciones: heces

Plazo (días): 5

Perfil diarrea vírica canina en heces (Parvovirus, Coronavirus y Rotavirus)

Catálogo de servicios

Perfiles

Instrucciones: heces

Plazo (días): 1

Perfil Ehrlichia PCR + Anaplasma PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, Médula ósea.

Plazo (días): 5

Perfil endocrino hurón (17 dihidroxiprogesterona, DHEA, Estradiol 17 beta)

Instrucciones: suero centrifugado 1 ml

Plazo (días): 8

Perfil Endocrino: 3 pruebas hormonales a elegir, de precio igual o inferior a 16 €. Ej: Cortisol/Creatinina en orina, T4 total, Estradiol, Progesterona

Instrucciones: suero y orina (si se pide cortisol/creatinina)

Plazo (días): 1

Perfil enfermedades respiratorias bovino (IBR PCR, BVD PCR, BRSV PCR, PI3 Ac, Pasteurella PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA, heces y exudado nasal o pulmón y sangre con EDTA

Plazo (días): 10

Perfil equino (Hemograma, urea, creatinina, prot. totales, GOT, GPT, LDH, GGT, fosfatasa alcalina, CPK, bilirrubina total)

Instrucciones: sangre con EDTA y suero

Plazo (días): 1

Perfil equino que incluye además bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ionograma (Calcio, Fósforo, Sodio, Potasio, Cloro), Fibrinógeno, GLDH y SDH.

Instrucciones: sangre con EDTA, suero y plasma con citrato

Plazo (días): 10

Perfil garrapata

Instrucciones: suero o plasma

Plazo (días): 1

Perfil Geriátrico canino o felino SIN Troponina I (Hemograma, Albúmina, ALT, AST, Bilirrubina, Creatinquinasa, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, Glucosa, Globulinas, Prote

Catálogo de servicios

Perfiles

Triglicéridos, Urea, T4

Instrucciones: suero 1 ml y EDTA 0.5 ml

Plazo (días): 1

Perfil geriátrico canino Valdevira

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Perfil geriátrico felino Valdevira

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Perfil grandes animales (Hemograma y 10 pruebas bioquímicas a elección del facultativo, de precio igual o inferior a 4 euros)

Instrucciones: sangre con EDTA y suero

Plazo (días): 1

Perfil infecciosas equino (Fiebre del Nilo PCR, Arteritis Ac, Rinoneumonitis Ac, Influenza PCR, Anemia infecciosa Ac, Babesia caballi Ac, Theileria equi Ac)

Instrucciones: sangre con EDTA (0.5 ml), suero (1 ml) e hisopo nasal sin carbón activo

Plazo (días): 5

Perfil leucemia caniPno (Hemograma+Frotis+Citometria de flujo+PARR)

Instrucciones: 3ml sangre con EDTA + Frotis sanguíneo sin fijar ni teñir

Plazo (días): 1

Perfil leucemia felino (Hemograma+Frotis+Felv+Fiv+PARR)

Instrucciones: 3ml sangre con EDTA + Frotis sanguíneo sin fijar ni teñir

Plazo (días): 1

Perfil Muscular Equino (Hemograma, GOT, GGT, CPK, LDH, Sodio, Potasio)

Instrucciones: suero y sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA

Plazo (días): 1

Perfil neurológico

Catálogo de servicios

Perfiles

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml y suero centrifugado (0.5 ml)

Plazo (días): 3

Perfil neurológico canino (Moquillo PCR, Neospora IgG, Toxoplasma IgG, Criptococcus PCR, Ehrlichia IgG, Calcio, Glucosa)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml, suero centrifugado 0.5 ml y orina (15 ml)

Plazo (días): 3

Perfil PCR (se puede solicitar cualquier PCR de infecciosas de nuestro listado, cobrándose la de mayor precio más 15 euros por cada PCR adicional)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Perfil Poliuria/Polidipsia (Hemograma, urea, creatinina, GOT, GPT, proteínas totales, fosfatasa alcalina, glucosa, albúmina, fructosamina, globulinas, cociente albúmina/globulinas, sistemático de orina, cortisol/creatinina orina)

Instrucciones: sangre con EDTA, suero y orina

Plazo (días): 2

Perfil protrombina

Instrucciones: plasma citratado

Plazo (días): 1

Perfil tiroideo (T4 total, T4 libre y TSH específica de especie)

Instrucciones: suero(de 7 a 10 días sin tomar corticoides)

Plazo (días): 2

Perfil tiroideo felino (T4 total, T4 libre, TSH sólo especie felina y colesterol)

Instrucciones: 0.5 ml de suero centrifugado o 1 ml de sangre

Plazo (días): 5

PIF, perfil para diagnóstico de, líquido ascítico o pleural

Instrucciones: líquido ascítico o pleural (5 mL)

Plazo (días): 5

PIF, perfil para diagnóstico de, sangre o suero (IgG de PIF-1, IgG de PIF-2, Amiloide séri

Catálogo de servicios

Perfiles

marcador inflamatorio)y Cociente albúmina/globulinas)

Instrucciones: sangre con EDTA (0.5 ml) y suero (1 ml)

Plazo (días): 1

Porcino 1,perfil

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero

Plazo (días): 1

Respiratorio aviar, perfil (Bronquitis infecciosa, avibacterium paragallinarum, laringotraqueítis aviar, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae y Newcastle) PCR

Instrucciones: exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmón

Plazo (días): 1

sangre con EDTA 1mL

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Boyero de Berna

Serológico/Inmunológico, perfil (IgG, IgM o antígeno de cualquier prueba infecciosa), 4 pruebas, cada prueba adicional son 7,21 euros más

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Tiroideo Control Canino, Perfil

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y suero (1 ml)

Plazo (días): 4

Tiroideo Control Felino, Perfil (Hemograma, Creatinina, GPT, Glucosa, Proteínas totales, Albúmina, Globulinas, Cociente A/G, Fosfatasa alcalina, Sodio, Potasio, Cloro, Urea, T4 total, SDMA, Bilirrubina total, Ratio Sodio/Potasio)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y suero (0.5 ml)

Plazo (días): 4

Tortuga básico, perfil (ácido úrico, GOT, glucosa, proteínas totales, calcio, fósforo, potasio)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Perfiles

Tos de las perreras (Adenovirus Ac, Bordetella cultivo)

Instrucciones: suero e hisopo faríngeo

Plazo (días): 1

Toxicología, perfil (se detectan 1500 tóxicos)

Instrucciones: Animal vivo: sangre EDTA, contenido gástrico, orina, cebo vómito. Animal muerto: contenido gástrico, hígado, riñón, pulmón, cebo, orina, tejido adiposo. SIN FORMOL y CONGELADAS

Plazo (días): 40

Vacunal heptavalente canino, perfil (Adenovirus canino IgG IFI (Hepatitis infecciosa canina), Leptospirosis IgG (IFI), Parvovirus canino IgG, Moquillo IgG)

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

A. phagocytophilum

Instrucciones: Sangre EDTA
Plazo (días): 10
Razas: todas las razas de caballo

Abiotrofia cerebelar equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 10
Razas: Árabe

Abiotrofia cerebelosa neonatal (NCCD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Vizsla, Beagle

Aborto bovino, perfil (Brucella rosa de bengala, IBR PCR, BVD PCR, Neospora PCR, Leptospira PCR, Campylobacter PCR, Tritrichomonas foetus PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml y placenta
Plazo (días): 5

Aborto caprino y ovino, Perfil (Brucelosis Rosa Bengala, Clamidiasis Ac, Fiebre Q Ac, Campylobacter PCR, Salmonella PCR, Listeria Ac, Listeria PCR, Neospora PCR, Toxoplasma PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y placenta o tejido fetal (hígado y pulmón)
Plazo (días): 5

Aborto Equino, Perfil (Herpesvirus equino PCR Leptospirosis PCR Arteritis Equina PCR Salmonella PCR con sonda ADN)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y placenta
Plazo (días): 7

Aborto Felino, Perfil (Cultivo, Mycoplasma PCR, Herpesvirus PCR, Paleucopenia PCR, Toxoplasma PCR, Tritrichomonas PCR y Campylobacter PCR)

Instrucciones: 2 Hisopos vaginales con medio transparente o sin medio
Plazo (días): 5

Aborto perinatal canino, perfil (Ac IgG Toxoplasma, Neospora y Brucella, PCR en hiso

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Campylobacter, Moquillo, Parvovirus y Herpesvirus, cultivo de E. coli en hisopo vaginal)

Instrucciones: suero (0.5 ml) e hisopo vaginal o prepucial con medio sin carbón (3 hisopos)

Plazo (días): 5

Ac anti T4

Instrucciones: suero 1ml

Plazo (días): 20

Acatalasemia

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Beagle

Acido hialurónico

Instrucciones: 1 ml suero

Plazo (días): 24

Acido láctico en silo avena

Instrucciones: 200 grs

Plazo (días): 10

Acido oxalico en pienso

Instrucciones: 100 grs

Plazo (días): 15

Ácido úrico orina

Instrucciones: orina

Plazo (días): 1

Acidos biliares (2ª prueba)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Ácidos biliares orina

Instrucciones: Orina

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

Ácidos Grasos alimentos

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Ácidos grasos polinsaturados en suero(EPA y DHA)

Instrucciones: 2 ml suero congelado

Plazo (días): 25

Aclarado de color (gato, todas las razas)

Instrucciones: sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso)

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas

Acrilamida Alimentos

Instrucciones: Alimento

Plazo (días): 1

Acrodermatitis enteropática (AE)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Van turco

Acrodermatitis letal LAD (Bull terrier y Bull terrier miniatura)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Bull Terrier y Bull Terrier Miniatura

Acromatopsia (Ceguera diurna) (ACHM)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán, Labrador retriever

Adenovirus aviar PCR

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: sangre con EDTA
Plazo (días): 5

Adenovirus canino IgG

Instrucciones: sangre o suero
Plazo (días): 1

Adenovirus canino IgM IFI

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Adenovirus canino tipo 1 (Hepatitis infecciosa canina)

Instrucciones: sangre con EDTA, hígado
Plazo (días): 5

Adenovirus canino tipo 2 (Traqueobronquitis infecciosa canina)

Instrucciones: sangre con EDTA, hisopo (sin medio o medio transparente) faríngeo, pulmón
Plazo (días): 5

Adenovirus canino tipos 1 y 2 PCR (Prueba combinada)

Instrucciones: sangre con EDTA, hígado, hisopo (sin medio o medio transparente) faríngeo, pulmón
Plazo (días): 5

Adenovirus reptiles PCR

Instrucciones: Hisopo sin medio, lavado traqueal o tejido
Plazo (días): 10

Adiponectina

Instrucciones: 1 mL suero. También plasma (EDTA, heparina). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Plazo (días): 15

ADN - Identificación Genética canina (huella genética, ADN canino, genotipado canino ISAG 2006) CON INSCRIPCIÓN EN

LA RSCE

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL/ hisopos especiales enviados por el laboratorio
Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Afibrinogenemia (AFG)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Teckel

Aflatoxinas (B1, B2, G1, G2)

Instrucciones:

Plazo (días): 10

Aflatoxinas (B1,B2,G1,G2)

Instrucciones: alimento, pienso

Plazo (días): 7

Aflatoxinas B1

Instrucciones: alimento, pienso

Plazo (días): 3

Aflatoxinas M1(metabolito B1)

Instrucciones: leche

Plazo (días): 10

AGP (Alfa 1 Glucoproteína Ácida, confirmación PIF)

Instrucciones: 400 ul suero o líquido ascítico o pleural

Plazo (días): 5

Agua en leche

Instrucciones: LECHE CONGELADA

Plazo (días): 5

Agua, análisis microbiológico (Recuentos de: aerobios totales, clostridios, E. coli, enterobacterias, St. aureus, Salmonella, Shigella, Hongos)

Instrucciones: agua en frasco estéril 1 litro

Plazo (días): 6

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Agua, análisis químico (incluye pH, conductividad, dureza, cloro activo, nitratos, nitritos, amoníaco, oxidabilidad)

Instrucciones: agua en frasco estéril 1litro

Plazo (días): 6

Agua, residuos hidrocarburos aromáticos policíclicos

Instrucciones: 1/2 litro de agua en vidrio topacio, tapón teflón

Plazo (días): 15

Agua, residuos hidrocarburos totales

Instrucciones: 1/2 litro de agua en vidrio topacio, tapón teflón

Plazo (días): 15

Albúmina líquido

Instrucciones: liquido

Plazo (días): 1

Aldicarb

Instrucciones: 20 gramos

Plazo (días): 12

Aldosterona orina

Instrucciones: 10 ml orina 24h congelada

Plazo (días): 5

Alergia panel combinado ambientales y alimentos canino (120 alergenos y CCD)

Instrucciones: suero o plasma 0.5 ml

Plazo (días): 6

Alergia panel combinado ambientales y alimentos equino (120 alergenos y CCD)

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 6

Alergia panel combinado ambientales y alimentos felino (120 alergenos y CCD)

Instrucciones: suero o plasma 0.5 ml

Plazo (días): 6

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Alergia plumas, escamas y pelo equino (gato, perro, conejo, conejo de indias, papagallo, pato, ganso)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Alergia Vacuna equina (1º Tratamiento)

Instrucciones: suero (Duracion 7 meses)

Plazo (días): 25

Alergia Vacuna equina (Mantenimiento)

Instrucciones: suero (Cada 8 meses)

Plazo (días): 25

Aleutiana, enfermedad

Instrucciones: 0.2 ml de suero

Plazo (días): 5

Alexander disease (AxD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Labrador retriever

Alfa 1 antitripsina

Instrucciones: heces congelado 5g

Plazo (días): 15

Alfa-manosidosis (AMD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Persa

Alfa2-macroglobulina

Instrucciones: 1 ml de suero centrifugado u orina de 24h

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Alfafetoproteína (marcador de tumores hepáticos y linfomas en canino)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

Alimento elaborado grupo A (con ingredientes no sometidos a tratamiento térmico), análisis microbiológico

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 5

Alimento elaborado grupo B (con tratamiento térmico), análisis microbiológico

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 5

Alimento elaborado grupo C (esterilizado), análisis microbiológico

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 5

Alimento elaborado grupo D (a base de vegetales crudos), análisis microbiológico

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 5

Almidón

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Almidón soluble

Instrucciones: Cereales 100g

Plazo (días): 8

Aluminio en agua

Instrucciones: agua

Plazo (días): 10

Ambiente, análisis microbiológico

Instrucciones: placa de superficie

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Amelogénesis imperfecta (hipoplasia del esmalte) (FEH)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Akita, Akita americano, Galgo italiano, Parson Russell terrier, Samoyedo

Amiloide Sérico tipo A (proteína amiloide, SAA, marcador inflamatorio) equino

Instrucciones: suero 0.5mL

Plazo (días): 5

Amiloide Sérico tipo A (proteína amiloide, SAA, marcador inflamatorio) felino

Instrucciones: sangre total EDTA

Plazo (días): 1

Aminas biógenas

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Aminoácidos

Instrucciones: 1 ml suero congelado

Plazo (días): 15

Aminoácidos orina

Instrucciones: Orina 50 ml

Plazo (días): 15

Aminograma completo alimentos

Instrucciones: alimento o disolución acuosa del alimento

Plazo (días): 7

Amoniaco (agua)

Instrucciones: Agua

Plazo (días): 1

Amonio (plasma)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 200 microlitros plasma edta congelado, pedir sistema de transporte al laboratorio
Plazo (días): 1

Amoxicilina en pienso

Instrucciones: 20g pienso
Plazo (días): 15

Análisis de la resistencia genética al Scrapie en ovejas

Instrucciones: sangre con EDTA
Plazo (días): 1

Análisis microbiológico completo de cama o pienso

Instrucciones: pienso, alimento ganado
Plazo (días): 7

Análisis Queso No pasteurizado

Instrucciones: 5 muestras de 150-200 g de cada tipo de queso a analizar
Plazo (días): 15

Análisis Queso Pasteurizado

Instrucciones: 5 muestras de 150-200 g de cada tipo de queso a analizar
Plazo (días): 15

Anaplasma canis IgM

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Anaplasma phagocytophilum (ehrlichiosis equina, anaplasmosis canina) Ac IgG

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Anemia diseritropoyética y miopatía (DAMS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin n
Plazo (días): 15
Razas: Labrador retriever, English springer spaniel

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Anemia felina, perfil (FeLV Ag, FIV Ac, Hemobartonella PCR)

Instrucciones: Sangre con EDTA 0.5ml, suero 0.5ml

Plazo (días): 3

Anemia Infecciosa (Test de Coggins)

Instrucciones: sangre o suero

Plazo (días): 5

Anemia Infecciosa Equina PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, médula ósea, ganglio o biopsia de bazo o hígado

Plazo (días): 3

Angiostrogylus canino antígeno

Instrucciones: suero

Plazo (días): 5

Anión GAP

Instrucciones: 1 ml suero refrigerado

Plazo (días): 1

Anomalía de May-Hegglin (MHA)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Carlino

Anomalía dental - esquelética - de retina (DSRA)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Cane corso

Anomalia Ocular del Collie (CEA)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 7

Razas: Alaskan Husky, Australian Kelpie, Australian Shepherd, Border Collie, Boykin Spaniel, Smooth, Hokkaido, Jack Russell Terrier, Koolie, Lancashire Heeler, Lapponian Herder, Long-Hair

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Tolling Retriever, Old English Sheepdog, Parson Russell Terrier, Shetland Sheepdog, Siberian Husky, Silken Windhound, Smithfield y Tamaskan Dog, pastor de Shetland, Perro cobrador de Nueva Escocia, Collie, Pastor americano miniatura, Pastor australiano

Anti-plaquetarios, anticuerpos

Instrucciones: Medula osea en EDTA

Plazo (días): 5

Antibiograma anaerobios (sumado a cultivo previo)

Instrucciones: muestra biológica

Plazo (días): 3

Antibióticos HPLC (unidad)

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Anticuerpos 2M

Instrucciones: 1 ml suero

Plazo (días): 25

Anticuerpos Anti HBC

Instrucciones: suero

Plazo (días): 2

Anticuerpos Anti Mi2 (miositis)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 30

Anticuerpos anti T3

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 20

Anticuerpos antiplaquetarios sangre entera (citometría de flujo para trombocitopenia inmune)

Instrucciones: 0.5 mL de sangre con EDTA . Analisis antes de 24 h extracción(er
Procesar URGENTE

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 3

Antifungigrama (sumado a cultivo previo)

Instrucciones: hisopo y otras muestras para cultivo

Plazo (días): 15

Antiinflamatorios (control antidoping)

Instrucciones: 20 mL de suero o plasma de heparina

Plazo (días): 30

AR1 (síndrome de insensibilidad a andrógenos)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Quarter horse

AR2, AR3, AR4, AR5 (síndrome de insensibilidad a andrógenos)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Warmblood, Pura sangre inglés, Tennessee walking horse

Arritmia ventricular (IVA)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Rhodesian ridgeback

Arsénico

Instrucciones: 10 g

Plazo (días): 10

Arsénico agua

Instrucciones: agua 500 ml indicar procedencia

Plazo (días): 10

Arsénico Orina

Instrucciones: Orina 2 ml

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 5

Arsénico pienso

Instrucciones: 50 grs pienso

Plazo (días): 10

Artemisia

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Arteritis Equina Anticuerpos

Instrucciones: suero

Plazo (días): 6

Arteritis Equina PCR

Instrucciones: Plasma de EDTA o Semen CONGELADOS. Tejidos extraembrionarios, hisopo nasal

Plazo (días): 7

Arteritis viral equina, prueba de neutralización de virus

Instrucciones: 0.5 ml de suero

Plazo (días): 10

Artritis encefalitis caprina.

Instrucciones: 0.5 ml de suero

Plazo (días): 6

Ascaridia galli

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 1

Ascaris suum Ac ELISA (consultar disponibilidad)

Instrucciones: suero o plasma 0.5ml

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Ascaris suum PCR

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 1

Asma Felino, perfil (Citología, Cultivo, Parásitos y Mycoplasma PCR de lavado bronquial, Parásitos en heces e IgE total en plasma)

Instrucciones: Lavado bronquial y heces

Plazo (días): 5

Aspergillus PCR (Subtipos patogénicos)

Instrucciones: Consultar en PCR

Plazo (días): 3

Aspergilosis IgG

Instrucciones: 1 ml suero separado y refrigerado

Plazo (días): 6

Ataxia Cerebelar canina

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Russell terrier, Fox terrier, Jack Russell Terrier, Parson Russell Terrier, Smooth Fox Terrier, Tenterfield Terrier

Ataxia cerebelosa (CA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 42

Razas: Spinone italiano

Ataxia de aparición tardía (LOA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 10

Razas: Parson Russell terrier, Russell terrier, Jack Russell terrier

Ataxia del sabueso finlandés (FHA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 10

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Sabueso finlandés, Spitz de Norbotten

Ataxia espinocerebelar (SCA) Fox Terrier, Parson Russell Terrier, Tenterfield Terrier

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Ataxia hereditaria (HA) Gordon Setter y Bobtail

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Gordon setter, Bobtail

Atrofia del sistema nervioso central ataxia cerebelar (CACA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga

Atrofia progresiva de retina (PRA3)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Spaniel tibetano, Tibetan terrier

Atrofia progresiva de retina (rdAc-PRA)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Munchkin, Balinés, Javanés, American curl, Peterbald, Somalí, Bengala, Abisinio, Seychellois, Ocicat, Siamés, Cornish rex, Thai, Tonkanés, Oriental de pelo corto, Singapura, Colorpoint shorthair

Atrofia progresiva de retina (rdy-PRA)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Abisinio, Ocicat, Somalí

Atrofia progresiva de retina canina (prcd-PRA)

Instrucciones: sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de ra

Plazo (días): 7

Razas: Pastor australiano, Bolonka zwetna, Boyero australiano, Boyero de Entlebuch, Caniche, Pe

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Chihuahua, Cocker spaniel americano, Cocker spaniel inglés, Perro crestado chino, Golden retriever, Kuvasz, Labrador retriever, Labradoodle, Lagotto romagnolo, Markiesje, Pastor australiano stumpy tail, Pastor inglés, Perro finlandés de Laponia, Perro cobrador de Nueva Escocia, Perro de agua español, Perro de agua portugués, Perro de osos de Carelia, Perro esquimal americano, Perro pastor lapón, Retriever de la bahía de Chesapeake, Schipperke, Schnauzer gigante, Silky terrier, Spitz alemán, Wäller, Yorkshire terrier, Pastor belga malinois, Perro de agua irlandés

Atrofia progresiva de retina felina (pd-PRA)

Instrucciones: sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de raspado bucal

Plazo (días): 7

Razas: Angora turco, Azul ruso, British shorthair, British longhair, Chartreux, Exótico de pelo corto, Kartäuser, Persa, Ragdoll, Sagrado de Birmania, Scottish fold, Selkirk rex

Atrofia Progresiva de Retina GTPBP2, Labrador Retriever

Instrucciones: sangre con EDTA (0.5 mL) o hisopo

Plazo (días): 7

Razas: Labrador Retriever

Aujeszky (ADV gl-virus de campo)

Instrucciones: 1 ml suero

Plazo (días): 7

Aujeszky IgG (perro)

Instrucciones: suero 1ml

Plazo (días): 5

Aujeszky PCR (detección de DNA)

Instrucciones: sangre con EDTA sin centrifugar o tejido nervioso

Plazo (días): 3

Aviar básico con hemograma

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero

Plazo (días): 1

Aviar basico, perfil (ácido úrico, LDH, GOT, CPK, glucosa, proteínas totales, calcio, colesterol)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Aviar completo con hemograma

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero

Plazo (días): 2

Aviar completo, perfil (ácido úrico, LDH, CPK, glucosa, proteínas totales, calcio, colesterol, ácidos biliares, fósforo, GOT, triglicéridos, sodio, potasio, amilasa, proteinograma)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Avibacterium paragallinarum PCR

Instrucciones: exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmón

Plazo (días): 1

Azúcares reductores

Instrucciones: alimento/pienso

Plazo (días): 7

Azúcares totales

Instrucciones: alimento/pienso

Plazo (días): 7

Azufre (agua)

Instrucciones: 150 ml agua

Plazo (días): 10

Babesia (Theileria) equi Ac ELISA

Instrucciones: suero 0.5 ml

Plazo (días): 3

Babesia (Theileria) equi Ac IFI

Instrucciones: suero

Plazo (días): 4

Babesia bigemina

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Babesia bovis

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Babesia caballi Ac ELISA

Instrucciones: suero 0.5 ml
Plazo (días): 3

Babesia caballi Ac IFI

Instrucciones: suero
Plazo (días): 4

Babesia canis IgG ELISA

Instrucciones: suero o sangre
Plazo (días): 1

Babesia Gibsoni (tinción Giemsa)

Instrucciones: edta o heparina
Plazo (días): 1

Babesia o Theileria BOVINA u OVINA por PCR (detección de DNA)

Instrucciones: sangre con EDTA
Plazo (días): 3

Babesia o Theileria CANINA sp. por PCR (detección de DNA)

Instrucciones: sangre con EDTA
Plazo (días): 3

Babesia o Theileria EQUINA por PCR (detec. de DNA) (diferencia entre equi, caballi y otras)

Instrucciones: sangre con EDTA
Plazo (días): 3

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Babesia por fijación de complemento

Instrucciones: suero o plasma edta/hep

Plazo (días): 10

Babesia y Anaplasma, Perfil (PCR, uso en bovino)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 5

Babesia y Anaplasma, Perfil (PCR, uso en equino)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 5

Baerman, prueba de

Instrucciones: heces

Plazo (días): 2

Barf, Perfil (Hemograma, Calcio, Fósforo, Cobre, Zinc, Vitamina A, Vitamina D3, Albúmina, Creatinina, Proteínas totales, GPT (ALT))

Instrucciones: EDTA(1ml) y suero centrifugado (2ml) y 6ml sangre en tubo tapón blanco. Invertir 5-10 veces y poner el tubo en posición vertical hasta que coagule totalmente(60 min mín).Centrifugar 3000rpm 10 min y transferir sobrenadante al tubo tapón amarillo.Solicitar

Plazo (días): 10

Bario en agua

Instrucciones: agua

Plazo (días): 7

Bartonella henselae IgG IFI

Instrucciones: suero o plasma

Plazo (días): 1

Bartonella henselae IgM IFI

Instrucciones: suero o plasma

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Bas-PRA1

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 10
Razas: Basenji

Básico, perfil + Ehrlichia IgG

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero
Plazo (días): 1

Básico, perfil + leish can elisa

Instrucciones:
Plazo (días): 1

Básico, perfil + leishmania IFI

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero
Plazo (días): 1

Básico,perfil con SDMA

Instrucciones: sangre con EDTA(0,5ml) y suero (1 ml)
Plazo (días): 4

Básico. Perfil, Leishmaniosis IFI y Leishmaniosis PCR

Instrucciones:
Plazo (días): 3

BBS2-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: pastor de Shetland

BBS4-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Puli

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Benzodiazepinas orina confirmación

Instrucciones: orina 10 ml

Plazo (días): 1

Besnoitia Ac

Instrucciones: suero o plasma

Plazo (días): 5

Besnoitia biopsia

Instrucciones: piel con formol

Plazo (días): 5

Beta 2 globulina

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Beta Caroteno suero

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 10

Beta hidroxibutirato (Cuerpos cetónicos)

Instrucciones: suero y plasma EDTA

Plazo (días): 3

Beta-lactoglobulina

Instrucciones: 50 grs

Plazo (días): 15

Bicarbonato en agua

Instrucciones: Agua (50 ml)

Plazo (días): 1

bicarbonato suero

Instrucciones: 0.5ml de suero

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 7

Biopsia adicional

Instrucciones: tejido en formol 10%

Plazo (días): 1

Biopsia tejidos grandes

Instrucciones: órgano o tejido en formol al 10%

Plazo (días): 5

Blanco/blanco moteado (dominante)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Bono regalo

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Border disease ELISA

Instrucciones: suero

Plazo (días): 5

Bordetella pertussis IgG (humano)

Instrucciones: 1 ml suero refrigerado

Plazo (días): 7

Bordetella sp. cultivo

Instrucciones: hisopo

Plazo (días): 7

Bornavirus anticuerpos

Instrucciones: suero 0.5 ml

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Bornavirus aviar (Enfermedad de dilatación proventricular) PCR cuantitativa

Instrucciones: CONSULTAR EN PCR

Plazo (días): 5

Bornavirus equino

Instrucciones: Líquido encefaloraquídeo, humor acuoso, sangre EDTA

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de caballo

Bowel, Enfermedad de (hurones, Rotavirus, Coronavirus, Helicobacter, Lawsonia, todas por PCR en heces))

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 7

Braquiuria, test genético

Instrucciones: sangre con EDTA o frotis bucal con hisopos SIN MEDIO

Plazo (días): 7

Razas: Braco de Borbón, Pastor polaco de tierras bajas, Corgi galés de Pembroke, Pastor de Saboya, Schipperke, Pinscher australiano, Pastor croata, Pastor australiano stumpy tail, Vallhund sueco, Jack Russell terrier, Perro de agua español, Pastor australiano, Mudi, Brittany spaniel, Perro de granja danés y sueco, Perro de osos de Carelia, Pastor americano miniatura, Terrier brasileño

Bromuro

Instrucciones: suero, 300 microlitros

Plazo (días): 2

Bronquitis Infecciosa Aviar PCR

Instrucciones: exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmón. Riñón, oviducto

Plazo (días): 1

BRSV

Instrucciones: suero

Plazo (días): 5

BRSV PCR (detección de RNA viral)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: Exudado nasal o pulmón y sangre con EDTA
Plazo (días): 7

Brucella abortus IgG IFI

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Brucella Canis (tinción Giemsa)

Instrucciones: edta o heparina
Plazo (días): 1

Brucella canis test aglutinación

Instrucciones: suero
Plazo (días): 4

Brucella ovis IgG

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Brucella Porcina ELISA

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Brucelosis canina IgG

Instrucciones: IgG o IgM (IFI) suero
Plazo (días): 1

Brucelosis canina IgM

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

BVD

Instrucciones: suero / En caso de que los animales estén vacunados con vac
puede hacer diferenciación de si los Ac son "naturales" o de l
inmunización.

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 7

BVD P80

Instrucciones:

Plazo (días): 7

BVD PCR (detección de RNA viral)

Instrucciones: sangre con EDTA u otro tipo de muestras biológicas

Plazo (días): 3

Cadiomiopatía hipertrófica felina Mutación 2 G-->A

Instrucciones: sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso)

Plazo (días): 20

Razas: Ragdoll

Cadmio agua

Instrucciones: agua 500 ml indicar procedencia

Plazo (días): 10

Cadmio pienso

Instrucciones: 50 grs pienso

Plazo (días): 10

Cadmio sangre

Instrucciones: sangre con EDTA 1 mL

Plazo (días): 5

Calcio alimentos

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Calcio en agua

Instrucciones: Agua (50 ml)

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Calcio iónico

Instrucciones: suero centrifugado (NO PUEDE SER TOMADO EN TUBO DE EDTA NI HEPARINA)
Plazo (días): 7

Calcio órganos

Instrucciones: órgano
Plazo (días): 7

Calcio orina

Instrucciones: orina
Plazo (días): 1

calcio(pienso)

Instrucciones: 50 grs pienso
Plazo (días): 10

Calcitonina

Instrucciones: suero (1 ml)
Plazo (días): 7

Cálculo biliar

Instrucciones: cálculo refrigerado
Plazo (días): 10

Calculos (cualitativo de núcleo y corteza)

Instrucciones: cálculo urinario
Plazo (días): 2

Calculos (cuantitativo de núcleo y corteza)

Instrucciones: cálculo urinario
Plazo (días): 5

Calicivirus felino IgG (IFI)

Instrucciones: suero

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

Calicivirus felino PCR

Instrucciones: Hisopo (sin medio o medio transparente) bucal o faríngeo, sangre con EDTA (menos recomendado) - suero como última opción

Plazo (días): 4

Calicivirus IgM

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Calicivirus y Herpesvirus felino IgG, perfil (gatos no vacunados)

Instrucciones: suero 0.1 mL

Plazo (días): 1

Calicivirus y Herpesvirus felino PCR, perfil

Instrucciones: 2 hisopos

Plazo (días): 3

Capas color canino B-locus (marrón, chocolate, hígado)

Instrucciones: sangre con EDTA 1ml o 2 hisopos sin medio

Plazo (días): 7

Capilaria PCR

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 1

capsulas

Instrucciones:

Plazo (días): 10

Carcinoma de células escamosas del dedo del pie

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA

Plazo (días): 10

Razas: Caniche, Schnauzer gigante

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Cardiomiopatía con mortalidad juvenil (CJM)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 7
Razas: Pastor belga

Cardiomiopatía dilatada (DCM)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL
Plazo (días): 15
Razas: Schnauzer mini, Schnauzer mediano, Schnauzer gigante

Cardiomiopatía dilatada (DCM)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Welsh springer spaniel

Cardiomiopatía dilatada DCM1 (PDK4, Doberman)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 20

Cardiomiopatía dilatada DCM1 + DCM2

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Dobermann

Cardiomiopatía dilatada DCM2 (Titin, Doberman)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 20

Cardiomiopatía hipertrófica felina HCM1 G-->C

Instrucciones: sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso)
Plazo (días): 20
Razas: Maine coon

Cardiomiopatía hipertrófica felina HCM4

Instrucciones: sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 7

Razas: American Shorthair, British Longhair, British Shorthair, Devon Rex, Exotic Shorthair, Maine Coon, Munchkin, Ragdoll, Scottish Fold, Sphynx

Carnitina Total Libre Plasma

Instrucciones: 1 ml de plasma heparina congelado (pedir envase especial al laboratorio)

Plazo (días): 10

Carotenos

Instrucciones: suero

Plazo (días): 7

Caseína

Instrucciones:

Plazo (días): 15

Catarata hereditaria (HSF4)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 20

Razas: Pastor americano miniatura, Pastor australiano, Wäller, Korthals griffon

Catarata hereditaria (HSF4)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor americano miniatura, Pastor australiano, Bulldog francés, Boston terrier, Staffordshire bull terrier

Catecolaminas Fraccionadas (Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina) en orina

Instrucciones: 10 mL de orina (24h) 0.1 mL de HCl

Plazo (días): 10

Catecolaminas Fraccionadas (Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina) plasma

Instrucciones: 3 ml plasma edta congelado

Plazo (días): 10

Cebada pienso

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 50 grs pienso
Plazo (días): 7

Ceguera nocturna (CSNB)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Briard

Células LE (tinción Lupus Eritematoso)

Instrucciones: sangre con EDTA
Plazo (días): 1

Células somáticas en leche (recuento)

Instrucciones: leche con conservante ,1 pastilla/100ml(solicitar al laboratorio)
Plazo (días): 1

Cenizas

Instrucciones: alimento
Plazo (días): 1

Centrífuga 6 tubos 1,5 ml (Eppendorff) (sólo para clientes, consultar descuentos)

Instrucciones:
Plazo (días): 7

Centrífuga LC-04B

Instrucciones:
Plazo (días): 3

Cereales, análisis de composición de

Instrucciones: Cereales 100g
Plazo (días): 8

Certificado oficial anticuerpos Rabia

Instrucciones:
Plazo (días): 30

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Ceruloplasmina

Instrucciones: suero 1mL

Plazo (días): 4

Chlamidia felis

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Chlamydomphila Ag ELISA (hisopo)

Instrucciones: hisopo

Plazo (días): 4

Chlamydomphila felis IgM

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Ciclosporina

Instrucciones: 1 ml EDTA

Plazo (días): 5

Circovirus canario PCR (no incluye gastos de transporte)

Instrucciones: sangre con EDTA, pluma en cañón o huevo

Plazo (días): 3

Circovirus paloma PCR

Instrucciones: 0.5 mL sangre con EDTA, pluma en cañón o huevo

Plazo (días): 7

Circovirus PCR porcino

Instrucciones: suero, tejido o heces

Plazo (días): 5

Circovirus Porcino Tipo 2

Instrucciones: suero

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 5

Circovirus porcino Tipo 2 IgM

Instrucciones: suero

Plazo (días): 5

Cistatina C

Instrucciones: Plasma o suero 1 ml

Plazo (días): 6

Cistinuria

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Landseer, Boyero australiano, Bulldog inglés, Bulldog francés, Antiguo bulldog inglés

Cistinuria canina

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Antiguo bulldog inglés, Boyero australiano, Bulldog continental, Bulldog francés, Bulldog inglés, Labrador retriever, Landseer, Mastín inglés, Pinscher miniatura, Corgi galés de Pembroke, Terranova

Cistoadenocarcinoma renal y fibrosis nodular (RCND)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán

CK-MB

Instrucciones: 1 mL de suero centrifugado

Plazo (días): 10

Clamidiasis grandes animales (suero, secreciones o heces)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Clasificación racial felina (análisis en base de datos)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA

Plazo (días): 30

Razas: Abisinio, British shorthair, Burmes, Sagrado de Birmania, Maine coon, Bosque de Noruega, Persa, Ragdoll, Siamés

Clonalidad linfocítica (PARR)

Instrucciones: Punción aspirativa con aguja fina del nódulo o 2ml de sangre con EDTA

Plazo (días): 7

Clonazepam suero

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 10

Cloro activo agua

Instrucciones: agua

Plazo (días): 5

Cloro orina

Instrucciones:

Plazo (días): 3

Cloro/Fósforo, Ratio (suero)

Instrucciones: suero 0.5 ml

Plazo (días): 1

Cloruros alimentos

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Cloruros en agua

Instrucciones: Agua (50 ml)

Plazo (días): 1

Clostridium botulinum neurotoxina anticuerpos

Instrucciones: suero 3 mL

Plazo (días): 25

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Clostridium IgG IFI

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Clostridium IgM

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Clostridium perfringes enterotoxina

Instrucciones: heces o tejido hepático

Plazo (días): 7

Clostridium tipificación especie

Instrucciones: heces

Plazo (días): 20

Clostridium agua

Instrucciones:

Plazo (días): 1

CNGA1-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor de Shetland

Coagulación, Perfil (Tiempo de Protrombina, Tiempo de Trombina, APTT, Fibrinógeno y Factor Von Willebrand conc canino)

Instrucciones: plasma citratado

Plazo (días): 3

Cobalto alimentos

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Cobalto suero

Instrucciones:

Plazo (días): 3

Cobre (pienso)

Instrucciones: 50 grs pienso

Plazo (días): 7

Cobre alimentos

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Cobre en agua

Instrucciones: agua 200 ml

Plazo (días): 1

Cocaína en orina

Instrucciones: 5 o 10 mL orina

Plazo (días): 1

Cociente Insulina/Glucosa

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Colapso inducido por ejercicio (EIC)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Boykin Spaniel, Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, Labrador Retriever, Pembroke Welsh Corgi, Labradoodle

Colesterol alimentos

Instrucciones: 100gr

Plazo (días): 7

Colinesterasa eritrocitaria

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 2 ml sangre EDTA
Plazo (días): 5

Color (agua)

Instrucciones:
Plazo (días): 1

Color capa russet

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Burmes

Color de pelo agouti (gato, todas las razas)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL
Plazo (días): 10
Razas: todas las razas

Color de pelo ámbar (gato noruego del bosque)

Instrucciones: sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso)
Plazo (días): 10
Razas: Bosque de Noruega

Color de pelo canino - Panel básico - Incluye Locus E (e1), Locus A (DY/SY/AG/BS/BB/a), Locus B (bs/bc/bd), Locus K, Locus D (d1), Locus S (Spot)

Instrucciones: sangre con EDTA 0.5 mL
Plazo (días): 1
Razas: todas las razas

Color de pelo canino Capas 1 solo gen (ej. Negro, marrón, MC1R)

Instrucciones: sangre con EDTA
Plazo (días): 10

Color de pelo chocolate (gato, todas las razas)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL
Plazo (días): 10
Razas: todas las razas

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Color de pelo Siam - punto (gato, todas las razas excepto Bengala)

Instrucciones: sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso)

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color de pelo y longitud y tipo de pelo canino, perfil

Instrucciones: sangre con EDTA 0.5 ml

Plazo (días): 15

Color equino

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Abigarrado

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Champagne

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas

Color equino - Complejo leopardo

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Dilución

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Hiperpigmentación

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15
Razas: todas las razas

Color equino - Mushroom

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15
Razas: Shetland

Color equino - Patrón appaloosa 1

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15

Color equino - Perla

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15
Razas: todas las razas

Color equino - Rizado

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15
Razas: todas las razas

Color equino - Roan zygosity

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 30
Razas: todas las razas de caballo

Color equino - Silver dapple

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15
Razas: todas las razas

Color equino - Snowdrop

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Tinker, Gypsy cob

Color equino - Splashed white (SW 1+2+3+4)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Sunshine

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - SW 5+6 (blanco moteado)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas

Color equino - Tobiano

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino Alazán

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas

Color equino Blanco dominante - W5, W10, W13, W20 y W22

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas

Color equino Camarillo blanco - W4

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Color equino Crema

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 10
Razas: todas las razas

Color equino Sabino-1

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15
Razas: todas las razas

Color equino Tordo

Instrucciones: 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 30
Razas: todas las razas

Combinación color de capa equino - colores básicos (Agoutí, castaño)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA
Plazo (días): 15
Razas: todas las razas de caballo

Combinación color de capa equino - diluciones (Champagne, crema, dun, perla, plata)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA
Plazo (días): 15
Razas: todas las razas de caballo

Combinación color de capa equino - patrón blanco (Appaloosa patrón 1, leopardo, moteado blanco 1-4, OLWS, sabino-1, tobiano)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA
Plazo (días): 15
Razas: todas las razas de caballo

Comparativa paternidad/maternidad canina

Instrucciones:
Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Complejo Respiratorio canino, Perfil (Adenovirus PCR, Parainfluenza PCR, Herpesvirus PCR, Bordetella PCR, Mycoplasma PCR)

Instrucciones: 2 hisopos con medio Stuart o Amies y 1 hisopo sin medio

Plazo (días): 1

Complejo Respiratorio Felino, Perfil

Instrucciones: 2 Hisopos (sin medio o medio transparente) nasales y/o faríngeos

Plazo (días): 5

Completo, perfil + leish can ELISA

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero

Plazo (días): 1

Completo, perfil + leishmania IFI

Instrucciones: sangre con anticoagulante y suero

Plazo (días): 1

Componentes de un pienso, cuantificación microscópica

Instrucciones: 50g pienso

Plazo (días): 10

Comportamiento

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor belga

Composición nutricional queso

Instrucciones: queso 100 grs

Plazo (días): 15

Condrodisplasia (CDPA) y condrodistrofia (CDDY) (IVDD-risk)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: todas las razas, Bulldog francés, Perro cobrador de Nueva Escocia, Yorkshire terrier

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Condrodisplasia (enanismo)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Perro cazador de alces noruego, Chinook, Perro de osos de Carelia

Conductividad (agua)

Instrucciones: agua

Plazo (días): 1

Contaje celular liquido

Instrucciones: liquido

Plazo (días): 1

Contaje eosinófilos

Instrucciones: EDTA

Plazo (días): 1

Contaje Linfocitos

Instrucciones: sangre con edta

Plazo (días): 1

Contaje Neutrofilos

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 1

Control negativo Leishmania infantum, Ehrlichia canis y Babesia canis, canino, 1mL

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Control positivo de Babesia canis, canino, 1 mL

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Coombs directo

Instrucciones: sangre con anticoagulante

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

Coombs directo equino

Instrucciones:

Plazo (días): 2

Coprológico ave, perfil (Parásitos, Cultivo y Tinción de Gram)

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 3

Coriomeningitis linfocítica virus PCR orina

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Coronavirus bovino heces

Instrucciones: heces

Plazo (días): 2

Coronavirus Bovino PCR

Instrucciones: heces, intestino, sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Coronavirus canino heces antígeno

Instrucciones: heces

Plazo (días): 1

Coronavirus canino IgG

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Coronavirus canino IgM (IFI)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Coronavirus Canino PCR

Instrucciones: cualquier muestra biológica (sin heparina)

Plazo (días): 3

Coronavirus de la rata PCR

Instrucciones: heces, sangre con EDTA, intestino

Plazo (días): 3

Coronavirus equino PCR

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de caballo

Coronavirus felino PCR (No PIF)

Instrucciones: heces, intestino, sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Coronavirus felino tipo I IgG (es la misma prueba que PIF tipo I)

Instrucciones: suero 1 mL

Plazo (días): 1

Coronavirus respiratorio canino PCR

Instrucciones: tejido pulmonar, sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Corticoides en pienso

Instrucciones: 100 g de pienso

Plazo (días): 10

Cortisol (3 muestras)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Cortisol Inmulite

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: suero
Plazo (días): 5

Cortisol:ACTH, Ratio (Plasma)

Instrucciones: plasma con EDTA centrifugado antes de 1 hora y congelado
Plazo (días): 3

Cortisol/Creatinina orina (3 muestras)

Instrucciones: orina
Plazo (días): 1

Corynebacterium pseudotuberculosis PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, pus, hisopo (sin medio o medio transparente) nasofaríngeo
Plazo (días): 3

CPSE (test Odelis para hiperplasia benigna de próstata)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 7

crd-PRA (crd4-PRA)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 7
Razas: Teckel de pelo duro, Chihuahua

crd1-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: American staffordshire terrier

crd2-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Pit bull terrier americano

crd3-PRA

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Glen of imaal terrier

crd4-MAP9

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Akita, Akita americano, American staffordshire terrier, Pastor australiano, Beagle, Bichón frisé, Border collie, Boston terrier, Boxer, Brittany spaniel, Bullmastiff, Bull terrier, Bulldog francés, Bulldog inglés, Cane corso, Caniche, Carlino, Chihuahua, Chow chow, Cocker spaniel inglés, Dobermann, Dogo de Burdeos, Wire fox terrier, Toy fox terrier, Galgo italiano, Golden retriever, Gran danés, Husky siberiano, Labrador retriever, Pastor belga malinois, Mastín español, Pastor alemán, Pastor de los Pirineos, Perro de agua español, Pinscher miniatura, Braco alemán de pelo corto, Rottweiler, San Bernardo, Schnauzer mini, Setter inglés, Shetland sheepdog, Shih tzu, Spitz alemán, Staffordshire bull terrier, Terranova, Weimaraner, West highland white terrier, Basset leonado de Bretaña, Basset hound, Vizsla, Bearded collie, Cairn terrier, Cavalier king charles spaniel, Coton de Tulear, Dálmata, Tibetan terrier, Pomerania, Lagotto romagnolo, Lhasa apso, Mastín napolitano, Papillón, Parson Russell terrier, Bichón habanero, Shiba inu

Creatinina líquido

Instrucciones: líquido ascítico y otros exudados o trasudados

Plazo (días): 1

Cría de Tiza (Ascosferoris abejas)

Instrucciones: Larvas

Plazo (días): 3

Crioaglutininas

Instrucciones: suero

Plazo (días): 2

Cromo alimentos

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 1

Cryptococcus capsular neoformans (Antígeno)

Instrucciones: 0.5 ml suero

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Cryptococcus neoformans PCR

Instrucciones: sangre con EDTA o LCR

Plazo (días): 4

Cryptosporidium PCR

Instrucciones: Heces, sangre EDTA

Plazo (días): 4

CSNB2 (ceguera nocturna estacionaria congénita)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Tennessee walking horse

CTX-II

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 1

Cultivo aerobios grandes animales incluye Bacillus, Bacteroides, Bordetella, Brucella, Clostridium, Coxiella, E. coli, Erysipelotrix, Fusobacterium, Haemophilus, Nocardia, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Yersinia y Hongos

Instrucciones: escobillón con medio u órganos

Plazo (días): 6

Cultivo de organos

Instrucciones: Organos

Plazo (días): 6

Cultivo de organos (muestra adicional)

Instrucciones: Organos

Plazo (días): 6

Cultivo e identificación en leche cuantitativo (grandes animales sin Mycoplasma). Incluye preincubación, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Hongos, E. coli, etc

Instrucciones: leche sin conservante

Plazo (días): 6

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Cultivo grandes + Mycoplasma, Campylobacter o anaerobios

Instrucciones: escobillón con medio u órganos

Plazo (días): 6

Cytokeratin 19 Fragment (CYFRA 21-1, marcador tumoral digestivo)

Instrucciones: 1 ml suero o plasma

Plazo (días): 3

D-locus d1 (dilución) MLPH todas las razas

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: todas las razas, American Staffordshire terrier, Perro de agua irlandés, Bolonka zwetna, Dobermann, Landseer, Rhodesian ridgeback, Gran boyero suizo

DBO(Demanda biológica de Oxígeno)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Defecto de la cabeza

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Burmes

Defecto MDR1 (sensibilidad a la ivermectina)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: todas las razas

Deficiencia C3 (C3)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Spaniel bretón

Deficiencia de adhesión leucocitaria (CLAD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin n

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 10

Razas: Setter irlandés rojo y blanco, Setter irlandés

Deficiencia de adhesión leucocitaria III (LAD3)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán

Deficiencia de fosfofructoquinasa (PFKD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Cocker spaniel americano, Spaniel alemán (Deutscher Wachtelhund), English springer spaniel, Whippet

Deficiencia de precalicreína (KLK)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Shih tzu

Deficiencia de succínico semialdehído deshidrogenasa (SSADHD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Saluki

Deficiencia en la piruvato deshidrogenasa fosfatasa 1 (PDP1)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Clumber spaniel, Sussex spaniel

Deficiencia Factor XI

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Maine coon

Deficiencia factor XI (F11)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Kerry blue terrier

Deficiencia factor XII (F12)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Deficiencia MCAD

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Degeneración cerebelosa y miositis (CDMC)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Perro cobrador de Nueva Escocia, Nova scotia duck tolling retriever

Degeneración de conos (CD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Braco alemán de pelo corto

Degeneración del sistema múltiple canina (CMSD, Crestado chino y Kerry Blue Terrier)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 14

Degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 1 (SDCA1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga, Pastor holandés

Degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 2 (SDCA2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga, Pastor holandés

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Degeneración Sistémica Múltiple (Crestado Chino)

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Perro crestado chino

Demodex PCR

Instrucciones: raspado de piel

Plazo (días): 3

Dermatofitosis (Tiña) PCR

Instrucciones: pelo, raspados cutáneos

Plazo (días): 5

Dermatomiositis (DMS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor de Shetland, Collie

Detección de Batrachochytrium spp. por PCR

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Detección de Chlamidophila spp. por PCR

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Detección de Mycoplasma sp. en tortugas por PCR

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Detección de Ranavirus en reptiles por PCR

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

DetECCIÓN DE REOVIRUS EN REPTILES POR RT-PCR

Instrucciones:

Plazo (días): 7

DETERMINACIÓN DE ESPECIE CANINA PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, tejido, sangre en superficie o diferentes muestras biológicas (Consultar casos específicos)

Plazo (días): 1

DIABETES, PERFIL (Hemograma, Urea, Creatinina, Glucosa, Fructosamina, Insulina, HOMA-IR, Triglicéridos, Sistemático de orina, Proteínas en orina, Creatinina en orina, Ratio Proteína/Creatinina en orina, Urocultivo)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) , suero (1 ml) y orina (2 ml)

Plazo (días): 1

DIARREA EPIDÉMICA PORCINA PCR

Instrucciones: heces, intestino, hisopo (sin medio o medio transparente) oral, sangre con EDTA

Plazo (días): 3

DIARREA EQUINO EN HECES, PERFIL (Parásitos, Rotavirus, Coronavirus, Cryptosporidium parvum, Salmonella PCR con sonda ADN, Clostridium PCR, Giardia sp. antígeno, coccidios, Lawsonia. PCR)

Instrucciones: heces

Plazo (días): 5

DIARREA FELINO, PERFIL (real time PCR Clostridium perfringens , Cryptosporidium spp ., Coronavirus felino , virus Panleucopenia felina , Giardia spp . , T oxoplasma gondii , Tritrichomonas foetus, Campylobacter spp. y Salmonella spp .)

Instrucciones: heces

Plazo (días): 5

DIÁTESIS HEMORRÁGICA (Síndrome Scott)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán

DIAZEPAM SUERO

Instrucciones: suero

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 8

Digoxina

Instrucciones: suero 0.5 ml

Plazo (días): 8

Dilución de color y defectos neurológicos (CDN)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Teckel

Disentería hemorrágica porcina (*Brachyspira hyodysenteriae*) PCR

Instrucciones: Heces, tejido digestivo, hisopo rectal (sin medio o medio transparente)

Plazo (días): 5

Disfunción cerebral (CDFS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Perdiguero de Stichelhair

Disostosis espondilocostal (defecto Comma)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mediano

Displasia de retina (OSD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Labrador retriever

Displasia ectodérmica (ED/SFS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Retriever de la bahía de Chesapeake

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Displasia esquelética 2 (enanismo) (SD2)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Labrador retriever, Labradoodle

Displasia esquelética (SKD, British Shorthair)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: British shorthair

Displasia Frontonasal (Burmese)

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Burmes

Displasia renal y fibrosis hepática (RDHN)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Norwich terrier

Disquinesia ciliar primaria (PCD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Alaskan malamute, Bobtail

Disquinesia paroxística (PxD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Soft coated wheaten terrier, Irish soft-coated wheaten terrier

Disquinesia paroxística inducida por ejercicio (PED)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor de Shetland

Distiquiasis

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Frisón

Distrofia macular de la córnea (MCD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Labrador retriever

Distrofia muscular (MD) Cavalier King Charles

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Cavalier king charles spaniel

Distrofia muscular (MD) Golden retriever

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Distrofia Muscular de Ullrich (Landseer)

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Landseer

Distrofia Neuroaxonal (NAD) Lagotto

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Lagotto romagnolo

Distrofia Neuroaxonal (NAD) Papillon

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Papillón

Distrofia Neuroaxonal (NAD) Perro de Agua español

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin r

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 7

Razas: Perro de agua español

Distrofia Neuroaxonal (NAD) Rottweiler

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Rottweiler

DMRT3 (SynchroGait)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Appaloosa, Bashkir curly, Caballo de monte, Islandés, Caballo miniatura, Trotador de sangre fría, Kentucky mountain saddle horse, Mangalarga, Missouri fox trotter, Morgan, Paint horse, Paso fino, Peruano de paso, Quarter horse, Saddlebred, Tennessee walking horse

Dopantes galgos, Perfil de 71 sustancias

Instrucciones: 2 tubos heparina 10ml

Plazo (días): 7

Doping equino (control de sustancias dopantes, 300 sustancias)

Instrucciones: 2 ml plasma citrato o suero

Plazo (días): 7

Doxiciclina capsulas 100 mg

Instrucciones:

Plazo (días): 10

Dureza de agua

Instrucciones: agua

Plazo (días): 5

Durina Ac

Instrucciones: suero

Plazo (días): 10

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

E. coli alimentos

Instrucciones:

Plazo (días): 5

E. coli ETEC (ELISA) k99

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 6

E. Coli Superficies

Instrucciones:

Plazo (días): 1

E.Coli (agua)

Instrucciones: agua

Plazo (días): 1

Echinococcus Granulosus (Hidatidosis) Elisa Antígeno en heces

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 15

Echinococcus Granulosus (Hidatidosis)PCR

Instrucciones: heces quiste hepatico

Plazo (días): 1

Ectima contagioso Ovino y Caprino (Parapoxvirus)

Instrucciones: Hisopado (sin medio o medio transparente) o tejido (sin formol) de las lesiones

Plazo (días): 3

Ehrlichia Canis test rápido 2 unidades

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Ehrlichia Canis test rápido 5 unidades

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Ehrlichia canis Anticuerpos IgG

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Ehrlichia canis IgM (IFA)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Ehrlichia IgG IFI y Anaplasma IgG IFI

Instrucciones: suero 0.5 ml

Plazo (días): 1

Ehrlichia platys Ac

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

Ehrlichia-Rickettsia-6 Bioquímicas a elegir, de precio igual o inferior a 4 euros, Perfil

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Ehrlichiosis equina Anticuerpos

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Ehrlichiosis IFI (6 o más muestras en un solo envío)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Elastasa

Instrucciones: 1 g heces congeladas

Plazo (días): 5

EMH Hipertermia maligna equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA preferiblemente o 20-30 pelos de la crin o la

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 10

Razas: Quarter horse, Paint horse, Appaloosa

Enanismo

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Frisón

Enanismo (ACAN, condrodisplasia)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Caballo miniatura, Shetland

Enanismo desproporcionado

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Dogo argentino, Vizsla

Enanismo pituitario (forma hipofisaria)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán, Pastor blanco suizo, Saarloos wolfdog, Perro lobo checoslovaco, Tibetan terrier, Perro de osos de Carelia

Encefalitis por garrapatas, virus PCR (TBEV Tick Borne Encephalitis Virus)

Instrucciones: sangre con EDTA 1ml o garrapata

Plazo (días): 5

Encefalomiелitis equina occidental PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, tejidos o líquido cefalorraquídeo

Plazo (días): 3

Encefalomiелitis hemaglutinante porcina PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, tejido nervioso o tejido pulmonar

Plazo (días): 3

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Encefalopatía del husky (AHE)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Husky siberiano

Encefalopatía mitocondrial (MFE)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Bullmastiff

Encefalopatía necrotizante subaguda (SNE)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Yorkshire terrier

Encefalopatía neonatal (NEWS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Labradoodle, Caniche gigante

Encephalitozoon cuniculi IgG e IgM

Instrucciones: 500 microlitros de suero. Especificar especie: conejo o gato

Plazo (días): 4

Encephalitozoon sp. PCR

Instrucciones: orina, heces y edta

Plazo (días): 5

Endocrino-cutáneo completo, Perfil (Hemograma completo, colesterol, triglicéridos, ALT, ALP, glucosa, ratio cortisol-creatinina urinario (UCCR), examen en fresco de pelo, estradiol, progesterona, testosterona, IGF?1, insulina, T4 total, T4 libre, TSH canina)

Instrucciones: orina, sangre con edta ,suero (1mL) y pelo

Plazo (días): 3

Enf. de almacenamiento del lagotto (LSD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin n

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 10

Razas: Lagotto romagnolo

Enf. garrapatas canino, PCR perfil (Anaplasma PCR, Ehrlichia canis PCR, Rickettsia sp. PCR, Lyme PCR, Babesia o Theileria canis sp. PCR)

Instrucciones: Sangre con EDTA, Garrapata

Plazo (días): 5

Enfermedad Aleutiana PCR (Huron y visión)

Instrucciones: sangre con EDTA, heces

Plazo (días): 3

Enfermedad cerebral juvenil (JBD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Parson Russell terrier, Russell terrier, Jack Russell terrier

Enfermedad de acumulación de cobre (CT)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Bedlington terrier

Enfermedad de acumulación de cobre/ Enfermedad de Wilson (Huntaway, Labrador Retriever, New Zealand Heading Dog)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Huntaway, Labrador retriever, New Zealand heading dog

Enfermedad de Border (Virus de la frontera)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 1

Enfermedad de Lafora

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA

Plazo (días): 7

Razas: Beagle, Brussels Griffon, Chihuahua, Dachshund, French Bulldog, Miniature Wire-Hair
Welsh Corgi

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Enfermedad de Pacheco PCR (Herpesvirus aviar)

Instrucciones: sangre con EDTA 0.2 mL. Tejido

Plazo (días): 15

Enfermedad de Pico y Plumas PCR (detección de DNA)

Instrucciones: sangre con EDTA o pluma en crecimiento

Plazo (días): 3

Enfermedad de Stargardt (STGD, Degeneración de retina)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Labrador retriever

Enfermedad de von Willebrand Tipo 1

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Boyero de Berna, Coton de Tulear, Dobermann, Drentsche partridge dog, Pinscher alemán, Setter irlandés rojo y blanco, Kerry blue terrier, Kromfohlander, Manchester terrier, Papillón, Caniche, Stabyhoun, Corgi galés de Pembroke, Perro de agua irlandés, Labradoodle

Enfermedad de von Willebrand Tipo 2

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Braco alemán de pelo duro, Braco alemán de pelo corto

Enfermedad de von Willebrand Tipo 3 (vWD3)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Kooikerhondje, Pastor de Shetland, Scottish terrier

Enfermedad genética añadida a un pack (solo las incluidas)

Instrucciones: consultar en la enfermedad solicitada

Plazo (días): 0

Enfermedad Hemorrágica del Conejo PCR

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: Hisopo (sin medio), orina, heces, sangre con EDTA o tejidos
Plazo (días): 7

Enfermedad Hemorrágica Epizootica Bovina PCR

Instrucciones: Plasma de EDTA o Suero centrifugado
Plazo (días): 3

Enfermedad mixomatosa de la válvula mitral (MMDV)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 10
Razas: Cavalier king charles spaniel, Teckel

Enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo IIIa (Curly Coated Retriever)

Instrucciones:
Plazo (días): 0
Razas: Curly coated retriever

Enfermedad pulmonar inflamatoria (IPD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 10
Razas: Collie

Enfermedad pulmonar letal (LAMP3)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Airedale terrier

Enfermedad renal poliquística (PKD) (bull terrier)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15

Entamoeba histolytica PCR

Instrucciones: heces, mucosa intestinal, hisopo rectal (sin medio o medio transparente)
Plazo (días): 5

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Enteritis del visón PCR (Parvovirus del Visón)

Instrucciones: heces o sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Enteritis por coronavirus de los pavos PCR

Instrucciones: heces, intestino, sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Enterobacterias Alimentos

Instrucciones: Alimento

Plazo (días): 1

eo-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Perro de agua portugués, Perro de agua español

Epidermolisis bullosa distrófica (DEB)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor de Asia Central

Epidermolisis bullosa juntural (JEB) (braco alemán de pelo corto).

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 20

Razas: Braco Alemán de Pelo corto

Epilepsia (Pastor Belga)

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga

Epilepsia juvenil (JE)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin n

Plazo (días): 10

Razas: Lagotto romagnolo

LABORATORIO Dr. BARBA
C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)
Telf.: 91 364 58 35
Fax: 91 365 88 21

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Epilepsia mioclónica juvenil (JME)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 10
Razas: Rhodesian ridgeback

Episodic Falling (Cavalier king charles spaniel)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL
Plazo (días): 15
Razas: Cavalier king charles spaniel

Equino, perfil (Hemograma, urea, creatinina, prot. totales, GOT, GPT, LDH, GGT, fosfatasa alcalina, CPK, bilirrubina total)

Instrucciones: sangre con EDTA y suero
Plazo (días): 1

Eritropoyetina

Instrucciones: suero 0.5 ml congelado
Plazo (días): 3

Eritropoyetina suero equino

Instrucciones: suero congelado
Plazo (días): 5

Espina bífida (NTD)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Weimaraner

Estomatitis Vesicular Equina

Instrucciones: 1 mL de suero
Plazo (días): 20

Etanol

Instrucciones: sangre con EDTA en tubo de vacío 2 ml
Plazo (días): 3

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Etilenglicol (confirmación)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Exantema coital equino (EHV-3) PCR

Instrucciones: Hisopo (sin medio o medio transparente) genital o sangre sin heparinaHisopo (sin medio o medio transparente) genital o sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Expresión de Cox-2

Instrucciones: Biopsia previa

Plazo (días): 21

Extracto seco agua

Instrucciones: Agua (100 ml)

Plazo (días): 3

Extracto seco en leche

Instrucciones:

Plazo (días): 5

Factor II de coagulación plasma

Instrucciones: plasma citratado 0.5 ml

Plazo (días): 3

Factor IX de coagulación plasma

Instrucciones: plasma citratado 0.5 ml

Plazo (días): 10

Factor Reumatoide (sp. canina)

Instrucciones: 500 microlitros de suero centrifugado

Plazo (días): 5

Factor V de coagulación plasma

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: plasma citratado 0.5 ml
Plazo (días): 3

Factor VII (mutación)

Instrucciones: sangre EDTA 1 ml
Plazo (días): 10
Razas: Papillón

Factor VII de coagulación plasma

Instrucciones: 1ml plasma citrato pobre en plaquetas(doble centrifugación 2500rpm 15 min. Congelar sobrenadante y enviar congelado
Plazo (días): 7

Factor X de coagulación plasma

Instrucciones: 1ml plasma citrato pobre en plaquetas(doble centrifugación 2500rpm 15 min. Congelar sobrenadante y enviar congelado
Plazo (días): 7

Factor XI de coagulación plasma

Instrucciones: 1ml plasma citrato pobre en plaquetas(doble centrifugación 2500rpm 15 min. Congelar sobrenadante y enviar congelado
Plazo (días): 7

Fasciola hepática anticuerpos ELISA

Instrucciones: suero
Plazo (días): 15

FeLV

Instrucciones: Ag (EIA) sangre entera
Plazo (días): 1

FeLV + FIV (pruebas independientes)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

FeLV anticuerpos IFI

Instrucciones: suero

Plazo (días): 5

FeLV PCR (Virus de la Leucemia felina, detección de DNA)

Instrucciones: sangre con EDTA o médula ósea

Plazo (días): 4

FeLV PCR CUANTITATIVA (Virus de la Leucemia felina, detección de DNA)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Fenitoína (Difenilhidantoína)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

fenol orina

Instrucciones: orina

Plazo (días): 10

Fenotiacinas

Instrucciones: suero 2 ml

Plazo (días): 20

FGF23

Instrucciones: 300ul plasma EDTA congelado

Plazo (días): 24

Fibra Ácido Detergente

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Fibra Bruta

Instrucciones: alimento/pienso

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Fibra Neutro Detergente

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Fiebre del Nilo IgG e IgM (IFI)

Instrucciones: 1 ml suero

Plazo (días): 1

Fiebre Q IgM

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

Filariosis canina ELISA

Instrucciones: Ag (EIA) suero

Plazo (días): 1

Filariosis PCR (diferencia especies, *Dirofilaria immitis*, *Dirofilaria repens*, *Acanthocheilonema reconditum*, *Acanthocheilonema dracunculoides*)

Instrucciones: sangre SIN centrifugar y con EDTA

Plazo (días): 5

FIS (síndrome inmunodeficiencia potro)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Dales pony, Fell pony

FIV (inmunodeficiencia felina) ELISA

Instrucciones: IgG suero

Plazo (días): 1

FIV (Virus de la Inmunodeficiencia felina detección de DNA)

Instrucciones: sangre con EDTA o Médula ósea

Plazo (días): 5

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

FIV PCR cuantitativa (carga viral)

Instrucciones: sangre con EDTA 0.5 mL

Plazo (días): 3

Flúor (orina)

Instrucciones: 25 ml orina

Plazo (días): 10

Flúor pienso

Instrucciones: 50 grs pienso

Plazo (días): 10

Fluoruros en agua

Instrucciones: Agua (50 ml)

Plazo (días): 1

Formula Diferencial

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Formula Magistral

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Fosfatasa ácida prostática

Instrucciones: suero

Plazo (días): 5

Fosfatasa ácida total

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Fosfatasa alcalina orina

Instrucciones: orina

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Fosfatasa alcalina termoestable

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Fosfolípidos suero

Instrucciones:

Plazo (días): 10

Fósforo (pienso)

Instrucciones: 50 grs pienso

Plazo (días): 10

fosforo agua

Instrucciones: agua

Plazo (días): 1

Fósforo alimentos

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Fósforo orina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Freemartinismo

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 7

Frotis sanguíneo teñido con Giemsa

Instrucciones: edta o heparina

Plazo (días): 1

Fructosa plasma seminal

Instrucciones: 1 mL plasma seminal. Congelar y enviar congelado

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

FSH (hormona foliculoestimulante)

Instrucciones: suero 0,5 ml

Plazo (días): 7

FSH bovina

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 5

FSH canina

Instrucciones: suero refrigerado 1 ml, plasma o heparina

Plazo (días): 1

Fucosidosis

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: English springer spaniel

Fumonicina en pienso (Elisa)

Instrucciones: 100 grs pienso

Plazo (días): 5

Fumonicina en pienso(HPLC)

Instrucciones: 100 grs pienso

Plazo (días): 10

Función k (cálculo sobre T4 libre y colesterol)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Furnishing / pelo duro (RSPO2)

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Bolonka zwetna, Kromfohlander, Lagotto romagnolo, Vizsla, Perro de agua portugués

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Gangliosidosis (GM 1/GM 2)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Balinés, Javanés, Peterbald, Seychellois, Thai, Siamés, Tonkanés, Oriental de pelo corto, Korat

Gangliosidosis (GM1)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Perro de agua portugués, Husky siberiano, Shiba inu

Gangliosidosis (GM2)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Burmes

Gangliosidosis (GM2)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Chin japonés, Caniche toy, Shiba inu

Gangliosidosis GM1 (GLB1) Perro de agua portugues

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Perro de agua portugues

Garrapata equino PCR, perfil (Anaplasma PCR, Lyme PCR, Encefalitis por garrapatas, virus PCR (Tick Borne), Babesia o Theileria EQUINA por PCR (diferencia entre equi, caballo y otras), Rickettsia sp. PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA o garrapata

Plazo (días): 5

Gastos aduana (sólo Canarias)

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Gastos Transporte Internacional

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Gastrina

Instrucciones: SUERO CONGELADO

Plazo (días): 5

Gastroenteritis transmisible porcina

Instrucciones: heces, intestino, hisopo (sin medio o medio transparente) oral, sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Gastrointestinal Crónico completo Canino, Perfil (Hemograma, Creatinina, GOT, GPT, Proteínas totales, Fosfatasa alcalina, Albúmina, Globulinas, Cociente A/G, Glucosa, Folatos, Cobalamina, Triglicéridos, SDMA, Cloro, Sodio, Potasio, Ratios Na/K, Calcio, Fósforo, TLI canina, Colesterol, Proteína C reactiva)

Instrucciones: Edta y suero

Plazo (días): 7

Gastrointestinal Crónico completo Felino, Perfil (Hemograma, Creatinina, GOT, GPT, Proteínas totales, Fosfatasa alcalina, Albúmina, Globulinas, Cociente A/G, Glucosa, Folatos, Cobalamina, Triglicéridos, SDMA, TLI felina, Colesterol, Proteína C reactiva)

Instrucciones: Edta y suero

Plazo (días): 7

GBED (deficiencia del enzima desdoblador del glucógeno) sp. equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

Gen Merle

Instrucciones: sangre EDTA 0.5 mL

Plazo (días): 7

Genotipado bovino básico (18 NSPs)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Gentamicina muestras biológicas (concentración)

Instrucciones: hígado

Plazo (días): 1

Geriátrico canino completo + Índice de Neoplasia

Instrucciones: sangre con EDTA y suero

Plazo (días): 1

Geriátrico felino completo

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Gestación bovina, ovina y caprina, glicoproteína sociada a gestación (bovino, ovino y caprino) 10 test rápidos para nuestro analizador POCT

Instrucciones:

Plazo (días): 30

Gestación en yegua (PMSG)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 11

GGT orina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

GH (caprino) (consultar disponibilidad)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Glaucoma primario congénito (b-PRA)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Bengala

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Glaucoma primario congénito (PCG)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Oriental de pelo corto, Siamés

Glaucoma primario de ángulo abierto (POAG)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Basset hound, Basset leonado de Bretaña, Beagle, Perro cazador de alces noruego, Grifón vendeano

Glaucoma primario de angulo abierto y luxación de lente (POAG/PLL)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Shar pei

Glaucoma y Goniodisgenesia

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Border collie

Glicoproteína sociada a gestación (bovino, ovino y caprino)

Instrucciones: suero 1ml

Plazo (días): 3

Glucagón plasma

Instrucciones: 0.5 ml de plasma EDTA congelado. Es muy importante separar el plasma rápidamente después de la extracción y congelar.

Plazo (días): 10

Glucogenosis (GSD1a)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Bichón maltés, Pinscher alemán

Glucogenosis (GSD2) (Enf. Pompe)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin n

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 15

Razas: Perro finlandés de Laponia, Perro pastor lapón

Glucogenosis (GSD3a)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Retriever de pelo rizado

Glucosa 6P deshidrogenasa

Instrucciones: 1 ml sangre EDTA

Plazo (días): 3

Glucosa líquido

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Glucosa orina

Instrucciones: orina

Plazo (días): 1

Glutamato deshidrogenasa

Instrucciones: suero

Plazo (días): 10

Glutation Peroxidasa

Instrucciones: 1 ml de sangre con heparina

Plazo (días): 15

Glutation suero

Instrucciones:

Plazo (días): 15

GR-PRA1 (Golden Retriever)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin r

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Golden retriever

GR-PRA2 (Golden Retriever)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Grandes animales, perfil (Hemograma y 10 pruebas bioquímicas a elección del facultativo, de precio igual o inferior a 4 euros)

Instrucciones: sangre con EDTA y suero

Plazo (días): 1

Grasa bruta

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Grasa bruta en pienso

Instrucciones: 100 grs pienso

Plazo (días): 10

Grasa bruta en pienso (hidrólisis previa)

Instrucciones: 100 grs pienso

Plazo (días): 10

Grasa leche

Instrucciones: 10 ml leche con conservante ,1 pastilla/100ml(solicitar al laboratorio)

Plazo (días): 5

Grasa, Carbonato, Fosfato, Sal, Corrector

Instrucciones: pienso

Plazo (días): 7

Gripe A H1N1 PCR

Instrucciones: Hisopo sin medio cloaca

Plazo (días): 3

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Grupo sanguíneo canino (DEA 1.1)

Instrucciones: sangre con anticoagulante

Plazo (días): 1

Grupo sanguíneo felino determinación genética(alelos dominante y recesivo)

Instrucciones: sangre con EDTA o muestra de la mucosa oral tomada con un cepillo citológico, sin medio

Plazo (días): 7

Razas: Burmes, Devon rex, Bosque de Noruega, Persa, Siamés, Oriental de pelo corto, Siberiano

Grupo sanguíneo sp. felina

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 1

GSD Tipo IV, Enfermedad

Instrucciones: sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso)

Plazo (días): 20

Razas: Bosque de Noruega

Gumboro, Enfermedad de (aves)

Instrucciones: bolsa de Fabrizio, tonsila cecal o bazo

Plazo (días): 1

Gumboro, Enfermedad de (serpientes)

Instrucciones: hispado traqueal, pulmón o tráquea

Plazo (días): 1

Haya (Fagus sylvatica)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Hemobartonella sp. PCR

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 4

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Hemofilia A (deficiencia factor VIII)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Bobtail, Boxer, Pastor alemán, Rhodesian ridgeback

Hemofilia A Factor VIII prueba genética (boxer, habanero, pastor alemán)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 20

Hemofilia B (Factor IX)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Rhodesian ridgeback

Hemoglobina (específica aviar)

Instrucciones: sangre

Plazo (días): 1

Hemoglobina glicosilada canina

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 10

Hemoglobina orina

Instrucciones:

Plazo (días): 5

Hemograma completo (aves, reptiles, anfibios y peces)

Instrucciones: sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA

Plazo (días): 2

Hemograma y 10 pruebas bioquímicas de precio igual o inferior a 4 euros

Instrucciones: suero y sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA

Plazo (días): 1

Hemograma y 4 pruebas bioquímicas de precio igual o inferior a 4 euros

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: suero y sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA
Plazo (días): 1

Hemorragia postoperatoria (P2Y12)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Gran boyero suizo

Heparina mucosa intestinal

Instrucciones: mucosa intestinal
Plazo (días): 15

Heparina, 100 ml

Instrucciones:
Plazo (días): 1

Hepatitis A anticuerpos (simios)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 4

Hepatitis infecciosa canina IgG, Parvovirus IgG, Moquillo IgG (equivale a Vaccichek)

Instrucciones: suero 0.5 ml
Plazo (días): 1

HERDA (astenia dermal regional hereditaria equina)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 10
Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

Hermafroditismo PCR (vaca)

Instrucciones: 1 ml sangre con edta
Plazo (días): 7

Herpesvirus canino IgG

Instrucciones: suero

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

Herpesvirus canino IgM

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Herpesvirus canino PCR

Instrucciones: Hisopado (sin medio o medio transparente) vaginal, glande o prepucio, sangre con EDTA

Plazo (días): 4

Herpesvirus equino 5 (EHV-5)

Instrucciones: Hisopo sin medio nasal o faríngeo, sangre con EDTA

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de caballo

Herpesvirus Equino PCR (tipos 1, 4 y 2) PCR (Detección de ADN)

Instrucciones: sangre con EDTA, hisopado nasal, hisopado vaginal o tejidos extraembrionarios

Plazo (días): 5

Herpesvirus Equino Tipo 1

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Herpesvirus equino Tipo 1 PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, hisopado nasal, hisopado vaginal o tejidos extraembrionarios

Plazo (días): 5

Herpesvirus equino Tipo 1 y Tipo 4 PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, hisopado nasal, hisopado vaginal o tejidos extraembrionarios

Plazo (días): 5

Herpesvirus equino tipo 4 Ac IgG e IgM

Instrucciones: 0.5 ml suero refrigerado

Plazo (días): 3

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Herpesvirus felino IgG

Instrucciones: IgG (IFI) suero

Plazo (días): 1

Herpesvirus felino IgM

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Herpesvirus felino PCR

Instrucciones: Hisopado (sin medio o medio transparente) faringeo o sangre con EDTA

Plazo (días): 4

Herpesvirus PCR tortuga

Instrucciones: hisopo sin medio de lengua o tejido (lengua, intestino o cerebro)

Plazo (días): 10

Herpesvirus tipo 6 IgG (sólo simios)

Instrucciones:

Plazo (días): 60

Herpesvirus tipo 8 IgG (sólo simios)

Instrucciones:

Plazo (días): 60

Herpesvirus tipo I y II IgG (sólo humano)

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Heterakis gallinarum PCR

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 1

Hibridación en perdis roja

Instrucciones: sangre en tubo especial

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 30

Hidrocefalia

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Frisón

Hierro alimentos

Instrucciones: 10g

Plazo (días): 7

Hierro en heces.

Instrucciones: 10 g

Plazo (días): 8

Hierro pienso

Instrucciones: 50 grs pienso

Plazo (días): 10

Hipereplexia (Startle disease)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Irish wolfhound, Galgo español, Pastor americano miniatura, Pastor australiano

Hiperoxaluria primaria (PH)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Coton de Tulear

Hiperqueratosis digital (DH/HFH)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Kromfohlander, Irish terrier

Hiperqueratosis epidermolítica (EHK)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Norfolk terrier

Hipertermia maligna (MH) Carlino y Gran boyero suizo

Instrucciones:
Plazo (días): 0
Razas: Carlino, Gran boyero suizo

Hipertermia Maligna Canina (Collie, Doberman Pinscher, Pastor Alemán y Labrador Retriever)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 10
Razas: Collie, Dobermann, Pastor alemán, Labrador retriever

Hiperuricosuria (SLC)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL
Plazo (días): 7
Razas: todas las razas, Schnauzer gigante, Bulldog continental, Gran boyero suizo, Pastor alemán, Pastor americano miniatura, Irish soft-coated wheaten terrier, Lagotto romagnolo, American bully, Antiguo bulldog inglés, Kromfohlander, Terrier negro ruso, Perro lobo checoslovaco, Bulldog francés, Pastor australiano, Bulldog inglés

Hipocalcemia idiopática

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15
Razas: Pura sangre inglés

Hipokalemia

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Burmes, Cornish rex, Devon rex, Australian mist, Singapura, Sphynx, Tonkanés

Hipomielinización (Síndrome del cachorro temblador) (SPS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Weimaraner, English springer spaniel

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Hipomineralización dental (síndrome de Raine)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Border collie

Hipotiroidismo autoinmune canino, Perfil (Ac anti T3 y Ac anti T4)

Instrucciones: suero (1 ml)

Plazo (días): 20

Hipotiroidismo congénito (CHG) Bulldog frances

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Bulldog frances

Hipotiroidismo congénito (CHG) Perro de aguas español

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Perro de agua español

Hipotiroidismo congénito (Rat Terrier y Toy Fox Terrier)

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Rat Terrier, Toy Fox Terrier

Hipotiroidismo Congénito felino (British Shorthair, Domestic Longhair, Domestic Medium Hair, Domestic Shorthair, Russian Blue)

Instrucciones: sangre con EDTA o escobillon bucal

Plazo (días): 7

Razas: British shorthair, Domestic longhair, Domestic medium hair, Domestic shorthair, Russian blue

Hipotricosis y corta esperanza de vida

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Birmano

Histamina Sangre total

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 1 ml sangre Heparina refrigerado
Plazo (días): 9

Histoplasma capsulatum anticuerpos

Instrucciones: 1 mL de suero
Plazo (días): 8

Hormona luteinizante (LH, perro y gato)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 5

Humedad alimento (103° C)

Instrucciones: alimento
Plazo (días): 7

HWSD (síndrome separación de la pared del casco)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 10
Razas: Caballo miniatura, Connemara, Poni de silla alemán

I.Peróxidos

Instrucciones:
Plazo (días): 10

IBR

Instrucciones: suero
Plazo (días): 2

IBR gB Ac

Instrucciones: suero
Plazo (días): 9

IBR gE Ac

Instrucciones: suero
Plazo (días): 3

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

IBR PCR

Instrucciones: sangre con EDTA o tejidos
Plazo (días): 4

Ictiosis (Bulldog americano)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 10
Razas: Bulldog americano

Ictiosis congénita (síndrome Faltendoggen)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Gran danés

Ictiosis tipo 1 y 2 (Golden retriever)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 7
Razas: Golden retriever

Ictiosis tipo 2

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Golden retriever

Identificación de germen (pruebas rutinarias)

Instrucciones:
Plazo (días): 2

Identificación Genética canina (huella genética, ADN canino, genotipado canino ISAG 2006) SIN inscripción en la RSCE

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL/ hisopos especiales enviados por el laboratorio
Plazo (días): 20
Razas: todas las razas

IFT122-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin n

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 15

Razas: Perro finlandés de Laponia

IgA bovino

Instrucciones:

Plazo (días): 15

IgA canino

Instrucciones: suero o LCR (0.5 ml)

Plazo (días): 10

IgA equina

Instrucciones: suero 0.5ml

Plazo (días): 7

IgA Felino

Instrucciones: suero 0.5 mL

Plazo (días): 10

IgA ovino y caprino

Instrucciones:

Plazo (días): 1

IgA porcino

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

IgA total pollo (consultar antes de enviar)

Instrucciones: suero o plasma

Plazo (días): 1

IgE Acido acetilsalicílico

Instrucciones: suero 1 ml refrigerado

Plazo (días): 5

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

IgE total (sp. canina y felina)

Instrucciones: suero 100ul

Plazo (días): 5

IgG

Instrucciones: suero

Plazo (días): 4

IgG bovino

Instrucciones:

Plazo (días): 10

IgG canino

Instrucciones: suero 0.5 ml

Plazo (días): 10

IgG equina

Instrucciones: suero 0.5ml

Plazo (días): 7

IgG Felino

Instrucciones: suero 0.5 mL

Plazo (días): 10

IgG porcino

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

IgG total pollo (consultar antes de enviar)

Instrucciones: suero o plasma

Plazo (días): 1

IgM bovino

Instrucciones:

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

IgM canino

Instrucciones: suero

Plazo (días): 6

IgM equina

Instrucciones: suero 0.5ml

Plazo (días): 7

IgM Felino

Instrucciones: suero 0.5 mL

Plazo (días): 10

IgM porcino

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

Iguana, perfil (ácido úrico, GOT, glucosa, proteínas totales, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

IL-6 pollo (consultar antes de enviar, precio para lotes hasta 42 muestras)

Instrucciones: suero 0.5 ml

Plazo (días): 1

IL-8 pollo (consultar antes de enviar, precio para lotes hasta 42 muestras)

Instrucciones: suero 0.5 ml

Plazo (días): 1

Imagenes Histolab

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Imepitoina en sangre

Instrucciones: 1 ml suero centrifugado
Plazo (días): 15

imperfecta, glaucoma primario de ángulo abierto (POAG), deficiencia de piruvato quinasa (PK)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Beagle

Índice de Neoplasia canino (TK1+CRP)

Instrucciones:
Plazo (días): 1

Infertilidad canina temprana (antes de 21 días, Brucella PCR, Herpesvirus canino PCR, citología, antibiograma, T4 total)

Instrucciones: 3 hisopos vaginales y suero 0.5 mL
Plazo (días): 4

Inflamatorio canino, perfil (Proteína C reactiva, Amiloide sérico/SAA, Haptoglobina, Fibrinógeno)

Instrucciones: suero (1mL) y plasma citratado (0.5mL)
Plazo (días): 3

Influenza Aviar subtipo H5

Instrucciones: Hisopo sin medio cloaca
Plazo (días): 3

Influenza Aviar subtipo H7

Instrucciones: Hisopo sin medio cloaca
Plazo (días): 3

Influenza aviar tipo A

Instrucciones: 1 ml suero
Plazo (días): 7

Influenza equina PCR

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: sangre en EDTA o exudado nasal en hisopo sin medio
Plazo (días): 5

Influenza Porcina Ac IgG (consultar disponibilidad)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 7

Información nutricional (alimento)

Instrucciones: 100 g
Plazo (días): 14

Informe de inmunotipaje por citometria de flujo en canino (CD45 CD18 CD14 CD4 CD8 CD21 CD5 CD3 CD34 MHCII CD1a CD11c)

Instrucciones: Aspirado de ganglio (resuspendido en plasma del propio paciente en caso de linfoma), 3 ml sangre con EDTA o Heparina recibida antes de 24 horas desde la extracción, enviar entre lunes y jueves a laboklin, nunca viernes ni sabados, pueden pasar máximo 48h
Plazo (días): 7

Inhibina B (diagnóstico tumor granulosa)

Instrucciones: suero 1 ml
Plazo (días): 8

Inmunitario canino, perfil (Ac IgG frente a Moquillo, Parvovirus, Hepatitis infecciosa y Leptospirosis)

Instrucciones: sangre, plasma o suero (0.5 ml)
Plazo (días): 1

Inmunocitoquímica

Instrucciones: Biopsia previa
Plazo (días): 7

Inmunocomplejos circulantes

Instrucciones: 1 ml suero
Plazo (días): 10

Inmunodeficiencia Bovina

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: suero
Plazo (días): 2

Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Jack Russell terrier, Perro de agua frisón, Parson Russell terrier

Inmunodeficiencia severa ligada al cromosoma X (X-SCID)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Basset hound, Corgi galés de Pembroke

Inmunoglobulinas A(pollos)

Instrucciones:
Plazo (días): 1

Inmunoglobulinas G(pollos)

Instrucciones:
Plazo (días): 1

Inmunoglobulinas M(pollos)

Instrucciones:
Plazo (días): 1

Inmunohistoquímica 1 marcador (mastocitoma, melanoma, citoqueratoma, tipificación de tipo de linfoma B o T)

Instrucciones: tejido
Plazo (días): 15

Inmunohistoquímica de linfoma (Diferenciación entre linfoma B-T 2 marcadores)

Instrucciones: tejido
Plazo (días): 15

Inmunohistoquímica frente a papilomavirus canino

Instrucciones: bloque de parafina

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

Inmunotipificación Ac Melan A

Instrucciones: tejido biopsia previa

Plazo (días): 7

Inmunotipificación de linfoma felino

Instrucciones: Sangre con EDTA 2ml, enviar lunes o martes con extracción reciente

Plazo (días): 5

Inmunotipificación linfoma CD3 y CD20

Instrucciones: tejido

Plazo (días): 7

Inmunotipificación marcador cKit (CD117)

Instrucciones: Tejido (biopsia previa)

Plazo (días): 7

Interferon gamma

Instrucciones: 1 ml plasma EDTa refrigerado

Plazo (días): 20

Interleucina 8

Instrucciones: 1 ml suero congelado

Plazo (días): 1

Intolerancia alimentaria canina o felina, perfil (60 alimentos)

Instrucciones: suero 0.5ml

Plazo (días): 7

Isoenzima de la CPK(MM-CPK, MB-CPK, BB-CPK)

Instrucciones: 500 ul suero

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Isoenzima de la LDH(LDH-1, LDH-2, LDH-3, LDH-4, LDH-5)

Instrucciones: 500 ul suero

Plazo (días): 15

Isoenzimas de la fosfatasa alcalina (incluye C-ALP, inducida por esteroides)

Instrucciones: 500 ul suero centrifugado

Plazo (días): 10

JPH2-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Shih tzu

Kit tinción de Gram

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Km de recogida

Instrucciones:

Plazo (días): 8

L-2-HGA (L-2-hidroxiglutaraciduria)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Yorkshire terrier, Staffordshire bull terrier

Labio leporino, paladar hendido y sindactilia (CLPS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Perro cobrador de Nueva Escocia

Lactato

Instrucciones: Se extrae la sangre en tubos de Fluoruro EDTA hasta la marca, s
antes de 30 min y se separa el sobrenadante (plasma) al tubo de ta

Plazo (días): 4

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Lactosa leche

Instrucciones: leche con conservante, 1 pastilla/100ml (solicitar al laboratorio)

Plazo (días): 5

Laringotraqueítis infecciosa aviar (Gallid Herpesvirus tipo 1 GaHV-1)

Instrucciones: exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmón

Plazo (días): 1

Larvas pulmonares (identificación)

Instrucciones: heces

Plazo (días): 2

Lawsonia intracellularis

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 3

LCR, perfil (cultivo, citología, conteo celular y proteínas)

Instrucciones: LCR

Plazo (días): 5

LDH líquido

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Legionella agua

Instrucciones: 500 ml agua en envase estéril

Plazo (días): 10

Legionella PCR

Instrucciones: agua o muestras biológicas

Plazo (días): 5

Leish Can test ELISA

Instrucciones: suero

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

Leish Can, perfil básico

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Leish Can, perfil completo

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Leishmania completo con Leishmania por PCR, perfil

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y suero (0.5 ml)

Plazo (días): 3

Leishmania PCR + Leishmania IFI

Instrucciones: sangre con EDTA y suero. Muestras de tejido preferentemente sin formol o bloque de parafina

Plazo (días): 3

Leishmania, test rápido 10 unidades

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Leishmania, test rápido 5 unidades

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Leishmania+Ehrlichia+Filaria

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Leishmania+Ehrlichia+Proteinograma

Instrucciones: suero

Plazo (días): 2

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Leishmaniosis

Instrucciones: IgG o IgM (IFI) suero
Plazo (días): 1

Leishmaniosis + Ehrlichiosis

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Leishmaniosis + Ehrlichiosis+6 bioquímicas de precio igual o inferior a 4 euros

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Leishmaniosis antic no vacunales, Leptospirosis y Brucelosis (sólo perros guía)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Leishmaniosis anticuerpos no vacunales

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Leishmaniosis básico, perfil (IFI de leishmania, creatinina, GPT, proteínas totales, albúmina, globulinas, cociente albúmina/globulinas)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Leishmaniosis completo, perfil (Hemograma, IFI de leishmania, urea, creatinina, GPT, proteinograma, Proteína C reactiva)

Instrucciones: suero y sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA
Plazo (días): 2

Leishmaniosis completo, perfil con SDMA

Instrucciones: .
Plazo (días): 4

Leishmaniosis IFI (6 o más muestras en un solo envío)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

leishmaniosis IgM

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Leishmaniosis Leptospirosis Brucelosis (sólo perros guía)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Leishmaniosis PCR + Anticuerpos no vacunales

Instrucciones: sangre con EDTA
Plazo (días): 3

Lengua Azul PCR

Instrucciones: sangre con edta
Plazo (días): 3

Leptospira Interrogans Aglutinación microscópica (MAT)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 5

Leptospira microaglutinacion (grandes animales)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 7

Leptospirosis grandes animales

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Leptospirosis IgG (IFI)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Leptospirosis IgM (IFI)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

LER

Instrucciones: sangre con anticoagulante

Plazo (días): 14

Leucocitos(recuento manual)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 1

Leucodistrofia de células globoides

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Cairn terrier, Setter irlandés, West highland white terrier

Leucoencefalomielopatía (LEMP)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Leonberger, Rottweiler, Gran danés

Leucoencefalomielopatía espongiiforme (SLEM)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 42

Razas: Border terrier

Leucoencefalopatía (LEP)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Schnauzer mini, Schnauzer mediano, Schnauzer gigante

Leucosis Enzoótica Bovina

Instrucciones: suero

Plazo (días): 2

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Levetiracetam

Instrucciones: suero centrifugado y separado (1 ml)

Plazo (días): 5

LFS (Síndrome del potro lavanda)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Árabe

LH (equina)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 4

LH bovina

Instrucciones: suero

Plazo (días): 5

Lipocalina Asociada a Gelatinasa Neutrófila (NGAL), orina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL) Antigua ataxia cerebelar del American Stafford

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: American staffordshire terrier

Lipofuscinosis neuronal ceroid 12 (NCL12) Terrier tibetano

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Tibetan terrier

Lipofuscinosis Neuronal Ceroid 2 (NCL2) - Teckel

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Razas: Teckel

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Lipofuscinosis Neuronal Ceroide 5 (NCL5) - Golden Retriever

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Golden Retriever

Lipofuscinosis neuronal ceroides 6 (NCL6) Pastor australiano

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Pastor australiano, Pastor americano miniatura

Lipofuscinosis neuronal ceroides 7 (NCL7) Crestado chino

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Perro crestado chino

Lipofuscinosis neuronal ceroides 8 (NCL8) del Setter Inglés

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Setter inglés, Gordon setter

Lipofuscinosis Neuronal Ceroide tipo 5 (NCL5) - Australian Cattle Dog y Border Collie

Instrucciones: sangre con EDTA 1 mL

Plazo (días): 7

Razas: Border collie, Boyero australiano

Lipofuscinosis neuronal ceroides tipo 7 - NCL7 (Chihuahua y Crestado Chino)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Líquido ascítico, pleural u otros (cultivo, extensión, conteo celular y bioquímica)

Instrucciones: Se necesita un mínimo de 1 mL de muestra

Plazo (días): 2

Lisina alimentos

Instrucciones: alimento

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 7

Listeria

Instrucciones: 1 ml suero

Plazo (días): 7

Listeria alimento

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Listeriosis (*Listeria monocytogenes*) PCR

Instrucciones: Preguntar por casos concretos (Ej: sangre, tejidos, alimentos, agua o leche)

Plazo (días): 3

Locus A canino (ASIP) Shiba inu

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Shiba inu

locus e1, K-locus

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Caniche, Perro de agua irlandés, Shiba inu

Locus S Canino - White Spotting

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Labrador retriever

Longitud de pelo felino

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Longitud de pelo felino (segunda y sucesivas muestras de la misma camada)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: sangre con EDTA 0.5ml
Plazo (días): 15

Longitud y tipo de pelo canino

Instrucciones: sangre 0.5 ml
Plazo (días): 7

Loque Europeo PCR(melissococcus plutonius) abejas

Instrucciones: Larvas/Abejas
Plazo (días): 6

Louping III

Instrucciones: tejidos en formol
Plazo (días): 5

Lugol 100 ml

Instrucciones:
Plazo (días): 1

Lupus eritematoso exfoliativo cutáneo (ECLE)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Vizsla, Braco alemán de pelo corto

Luxación Primaria de Lente (PLL)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml)
Plazo (días): 7

Razas: Boyero australiano, Bull terrier miniatura, Carlino, Perro crestado chino, Fox terrier, Jack Russell terrier, Terrier alemán, Lakeland terrier, Lancashire heeler, Lucas terrier, Norfolk terrier, Norwich terrier, Parson Russell terrier, Patterdale terrier, Perro de granja danés y sueco, Perro esquimal americano, Rat terrier, Sealyham terrier, Teddy roosevelt terrier, Tenterfield terrier, American hairless terrier, Tibetan terrier, Toy fox terrier, Volpino italiano, Welsh terrier, Tejonero de Westfalia, Yorkshire terrier, Bull terrier, Russell terrier

Lyme grandes animales

Instrucciones: suero
Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Lyme IgG (IFI)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Lyme IgM (IFI)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Macrotrombocitopenia (MTC)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Bichón frisé, Boxer, Cairn terrier, Caniche, Cavalier king charles spaniel, Chihuahua, Cocker spaniel inglés, Bichón habanero, Jack Russell terrier, Labrador retriever, Bichón maltés, Norfolk terrier, Parson Russell terrier, Shih tzu, Cocker spaniel americano

macrotrombocitopenia (MTC), síndrome de Robinow (DVL2)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Bulldog continental, Shih tzu, Antiguo bulldog inglés, Bulldog francés, Bulldog inglés

Maedi Visna (mínimo 4 muestras. El envío individual tiene el precio de 4 muestras)

Instrucciones: 0.3ml suero

Plazo (días): 5

Magnesio alimentos

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Magnesio en agua

Instrucciones: Agua (50 ml)

Plazo (días): 1

Magnesio en orina

Instrucciones: Orina

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Magnesio eritrocitario

Instrucciones: sangre con EDTA 1 mL

Plazo (días): 4

Magnesio pienso

Instrucciones: 50 g pienso

Plazo (días): 1

Maíz/Gluten maíz

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Mal Rojo Porcino

Instrucciones: suero

Plazo (días): 5

Malformación Dandy-Walker (DWLM)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Eurasier

Manganeso pienso

Instrucciones: 50 g pienso

Plazo (días): 1

Manganeso suero

Instrucciones: 6ml sangre en tubo tapón blanco. Invertir 5-10 veces y poner el tubo en posición vertical hasta que coagule totalmente(60 min mín).Centrifugar 3000rpm 10 min y transferir sobrenadante al tubo tapón amarillo.Solicitar tubos al laboratorio

Plazo (días): 5

Marcador C-kit (diferenciacion mastocitoma)

Instrucciones: tejido en formol

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Marcadores histoquímicos (mínimo 2)

Instrucciones: tejido

Plazo (días): 20

Marek PCR

Instrucciones: Pluma, Tejido (hígado) o sangre con EDTA

Plazo (días): 4

Mascarilla FFP2 (10 unidades)

Instrucciones: Otros

Plazo (días): 1

Materia prima, análisis microbiológico

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Material embalaje

Instrucciones:

Plazo (días): 1

MDR1, defecto genético (sensibilidad a la ivermectina y otros fármacos)

Instrucciones: sangre con EDTA 0,5 ml

Plazo (días): 7

Razas: Bobtail, Border collie, Collie de pelo largo, Collie de pelo corto, Elo, Mc Nab, Pastor alemán, Pastor australiano, Pastor blanco suizo, Pastor de Shetland, Silken windhound, Wäller, Pastor americano miniatura

Megaesófago idiopático congénito (CIM)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán

Melatonina

Instrucciones: 600 microlitros de suero o 300 microlitros de saliva

Plazo (días): 30

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Melatonina caprino (lotes de 90 sueros, precio por unidad)

Instrucciones: plasma o suero congelado, refrigeración máximo 24 horas

Plazo (días): 1

Meningoencefalitis necrotizante (NME/PDE)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Carlino

Mercurio

Instrucciones: sangre con edta refrigerada.

Plazo (días): 10

Mercurio agua

Instrucciones: agua 500 ml incidcar procedencia

Plazo (días): 10

Mercurio orina

Instrucciones: 5 ml orina

Plazo (días): 6

Mercurio pienso

Instrucciones: 50 grs pienso

Plazo (días): 10

Metabólico equino, Perfil

Instrucciones: sangre con EDTA y suero

Plazo (días): 1

Metabólico-Neurológico, Perfil

Instrucciones: sangre con EDTA y suero centrifugado (0.5 ml)

Plazo (días): 2

Metahemoglobinemia (Chihuahua, Pomeranian y Rat Terrier)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Chihuahua, Pomeranian y Rat Terrier

Metanefrina

Instrucciones: 1 ml plasma EDTA(heparina menos recomendado) congelado

Plazo (días): 10

Metanefrinas plasmáticas

Instrucciones: plasma EDTA congelado 1 ml

Plazo (días): 7

Metilmalónico, ácido orina

Instrucciones: 2 ml suero congelado

Plazo (días): 22

Metilmalónico, ácido suero

Instrucciones: 10 ml orina congelada

Plazo (días): 22

Metritis Contagiosa Equina PCR (*Taylorella equigenitalis*)

Instrucciones: Muestras de tejidos, hisopo (sin medio o medio transparente), sangre con EDTA (menos adecuado)

Plazo (días): 5

Microbioma completo (metagenómica shotgun)

Instrucciones: hisopado oral o vaginal. Heces

Plazo (días): 30

Microfilarias

Instrucciones: 1 ml de sangre edta /hep

Plazo (días): 2

Microftalmia (RBP4)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin n

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 10

Razas: Irish soft-coated wheaten terrier

Mielopatía Degenerativa canina exón 2 (todas las razas)

Instrucciones: sangre con EDTA (0.5 mL)

Plazo (días): 7

Razas: todas las razas, Bulldog francés

Mielopatía degenerativa exón 1 (Boyero de Berna)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Boyero de Berna

Mieloperoxidasa

Instrucciones: heces

Plazo (días): 15

Minerales, grasa, sal(pienso)

Instrucciones: 100 grs pienso

Plazo (días): 7

Mioglobina

Instrucciones: 10 ml orina de 24h(indicar volumen total de 24h).En laboratorio alcalinizamos con carbonato sódico a pH:8-9

Plazo (días): 4

Mioglobina plasmática

Instrucciones: 1 ml plasma heparina refrigerado/ 1 ml suero refrigerado

Plazo (días): 7

Miopatía centronuclear (CNM) Labradoodle

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Labradoodle, Labrador retriever

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Miopatía Centronuclear (DNM2, Border Collie)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 1

Miopatía hereditaria (HMLR, DNM) Labrador Retriever

Instrucciones: sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso)

Plazo (días): 7

Razas: Labrador retriever, Gran danés, Terrier alemán

Miopatía inflamatoria (IM)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pastor holandés

Miopatía ligada al cromosoma X (XL-MTM)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Rottweiler, Labrador retriever

Miopatía nemalínica (NM)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Bulldog americano

Miotonía congénita del Labrador retriever

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 14

Razas: Border collie, Boyero australiano, Labrador retriever, Schnauzer mini

Miotonia congenita del Schnauzer Miniatura

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

Miotonia congénita felina

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Mixomatosis PCR

Instrucciones: sangre con EDTA o tejido(lesión)

Plazo (días): 3

MLS (Musladin Leuke Syndrome)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Molibdeno suero

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Monensina cuantificación

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Monensina detección

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Moquillo IgG (control de animales vacunados)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Moquillo LCR IgG e IgM

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Moquillo PCR

Instrucciones: Orina (6 mL cantidad minima) válida para cualquier sintoma hisopado sin medio o medio transparente: Síntomas respiratorios: rectal. Síntomas oculares y neurológicos: conjuntival.

LABORATORIO Dr. BARBA
C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)
Telf.: 91 364 58 35
Fax: 91 365 88 21

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 3

Moquillo suero

Instrucciones: IgG e IgM (IFI) suero

Plazo (días): 1

Mucina liquido

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Mucocele de vesícula biliar (GBM)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pomerania, Pastor de Shetland, Cairn terrier, Cocker spaniel americano, Cocker spaniel inglés

Mucopolisacaridosis tipo 6 (MPS6)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Pinscher miniatura

Mucopolisacaridosis tipo IIIa (MPS3a)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: New Zealand heading dog, Teckel de pelo duro

Mucopolisacaridosis tipo IIIb (MPS3b)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Schipperke

Mucopolisacaridosis tipo VI (MPS6)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: European shorthair, Balinés, Javanés, Peterbald, Birmano, Seychellois, Thai, Siamés, Tonk

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Mucopolisacaridosis tipo VII (MPS7)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Mucopolisacaridosis tipo VII (MPS7)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán, Terrier brasileño

Muerto equino

Instrucciones:

Plazo (días): 10

Mutación BRAF (carcinoma de células transicionales canino)

Instrucciones: Orina (10-15 mL) o tejido

Plazo (días): 15

Mutación causante de la ausencia de pelo en el gato esfinge

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml

Plazo (días): 10

Mutación de la miostatina (Bully - Gen)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Whippet

Mycoplasma agalactiae PCR

Instrucciones: Leche (minimo 3mL), Liquido articular (min 3 mL en tubo EDTA), o hisopos oculares SIN AGAR

Plazo (días): 15

Mycoplasma aviar

Instrucciones: sange con edta o hisopo bucal o cloacal (sin medio o medio transparente) o Heces

Plazo (días): 5

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Mycoplasma bovis ELISA (Antígeno)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 5

Mycoplasma bovis PCR

Instrucciones: hisopo nasal y lavado broncoalveolar

Plazo (días): 4

Mycoplasma haemolamae (Llama, alpaca)

Instrucciones: Sangre EDTA

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de alpaca

Mycoplasma hyopneumoniae Ac (Neumonía enzoótica). Bovino, Porcino

Instrucciones: suero

Plazo (días): 7

MYHM (miositis inmunomediada y miopatía)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

Narcolepsia (Doberman, labrador retriever, teckel)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Dobermann, Labrador retriever, Teckel

Narcolepsia del Doberman

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Dobermann

NECAP1-PRA

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Schnauzer gigante

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Necropsia (órganos recolectados en la clínica)

Instrucciones: hasta 4 órganos en formol

Plazo (días): 6

Necropsia animal tipo aborto - muerte perinatal (incluye biopsia e incineración)

Instrucciones: animal refrigerado muerto recientemente

Plazo (días): 6

Necropsia animal tipo adulto hasta 5 kg (incluye biopsia e incineración)

Instrucciones: Necropsia animales hasta 5 kg excepto aves, más de 5 kg consultar precio.

Plazo (días): 6

Necropsia animal tipo gallina - perdiz (incluye biopsia)

Instrucciones: animal refrigerado muerto recientemente

Plazo (días): 6

Necropsias (consultar antes de enviar)

Instrucciones: animal refrigerado muerto recientemente

Plazo (días): 6

Necropsias aves pequeñas

Instrucciones: animal refrigerado muerto recientemente o en formol con corte practicado en abdomen (visceras expuestas al formol)

Plazo (días): 6

Necropsias guacamayos

Instrucciones: animal refrigerado muerto recientemente o en formol con corte practicado en abdomen (visceras expuestas al formol)

Plazo (días): 6

NEFA

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Nefropatía con pérdida de proteínas (PLN)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Irish soft-coated wheaten terrier

Nefropatía Familiar (Cocker Spaniel Ingles)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 14

Nefropatía familiar (FN)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Samoyedo, English springer spaniel, Cocker spaniel inglés

Neospora (grandes animales)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Neospora caninum

Instrucciones: IgG (IFI) suero

Plazo (días): 1

Neospora caninum IgM

Instrucciones: suero o plasma

Plazo (días): 1

Neospora PCR

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 4

Neumonitis felina PCR (Chlamydiophila felis)

Instrucciones: sangre con EDTA, hisopo (sin medio o medio transparente) faríngeo u ocular

Plazo (días): 4

Neurológico equino, perfil (Herpesvirus tipo 1 Ac, Clostridium spp. Ac, Virus del Nilo PCR)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: suero y sangre con EDTA
Plazo (días): 5

Neurológico felino 1, perfil (PCR Real Time de: Toxoplasma, PIF, Cryptococcus, Panleucopenia, Bartonella, FeLV e Inmunodeficiencia)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml o Tejido
Plazo (días): 5

Neurológico felino 2, perfil (PCR Real Time de: Toxoplasma, PIF, Cryptococcus, Panleucopenia, Bartonella)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 mL
Plazo (días): 3

Neurológico hurón, perfil (Moquillo PCR, enfermedad aleutiana PCR, ratio insulínemia:glucemia, Cryptococcus PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) , suero (0.5 ml) y orina (5 ml)
Plazo (días): 4

Neuropatía Charcot-Marie-Tooth (CMT)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL
Plazo (días): 7
Razas: Schnauzer mini

Neuropatía hereditaria (GHN) (greyhound)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 16

Neuropatía Sensorial

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 7
Razas: Border collie

Nevus epidérmico queratinocítico (Chihuahua)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 7
Razas: Chihuahua

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Newcastle, Enfermedad de (Detección de DNA por PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA, heces, hisopados (sin medio o medio transparente), órganos

Plazo (días): 3

NFS (síndrome del potro desnudo)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Akhal-Teké

Nidovirus Serpiente PCR

Instrucciones: Hisopo sin medio, lavado traqueal o tejido

Plazo (días): 10

Níquel suero

Instrucciones: 2 ml suero sin gel separador

Plazo (días): 10

Nitrogeno

Instrucciones: agua

Plazo (días): 7

Nitratos (agua)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Nitratos (alimento)

Instrucciones:

Plazo (días): 15

Nitratos órganos

Instrucciones:

Plazo (días): 15

Nitritos (alimento)

Instrucciones: 10 g

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 7

Nitrógeno amoniacal (alimento)

Instrucciones:

Plazo (días): 7

NOMBRE

Instrucciones: MUESTRA REQUERIDA

Plazo (días): 1

Razas: RAZAS

Norepinefrina: Creatinina en orina, Ratio

Instrucciones: Orina 10 ml

Plazo (días): 1

Norfloxacina + Ketoconazol gotas óticas (otitis mixtas) 10 ml

Instrucciones:

Plazo (días): 5

Nosemosis abejas

Instrucciones: 15-30 abejas/larvas

Plazo (días): 3

OAAM (malformación occipitoatlantoaxial)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Árabe

Obesidad (ADI)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Retriever de pelo liso, Labrador retriever

Ochratoxina

Instrucciones:

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 7

Ocular felino completo, Perfil (Herpesvirus PCR, Chlamydomphila IgG, Bartonella PCR, PIF PCR, FeLV PCR, Mycoplasma PCR, Leishmania IgG, Toxoplasma IgG, Calicivirus PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y dos hisopos conjuntivales (sin medio o medio transparente)

Plazo (días): 5

Ocular felino, Perfil (Herpesvirus PCR, Chlamydomphila PCR, Mycoplasma PCR, Calicivirus PCR)

Instrucciones: Escobillón ocular

Plazo (días): 5

Ojo de tigre (tiger eye)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Paso fino

Ojos azules con defectos auditivos (PAX3 DBEALT)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL o hisopo bucal

Plazo (días): 7

Razas: British shorthair

Olor (agua)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

OLWS (Síndrome del blanco letal)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml

Plazo (días): 10

Razas: Quarter horse, Paint horse

One Step duo FELV/FIV 5 test

Instrucciones:

Plazo (días): 4

One Step duo FELV/FIV 5 test

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones:

Plazo (días): 4

Organofosforados cromatografía

Instrucciones: Contenido gástrico congelado

Plazo (días): 4

Ornithobacterium rhinotracheale (cultivo + API)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Osteocondrodisplasia felina (Scottish Fold)

Instrucciones: sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso)

Plazo (días): 20

Razas: Scottish fold

Osteogénesis imperfecta (COL1A1) Golden Retriever

Instrucciones: sangre con EDTA 1 mL, cepillo bucal (menos recomendable)

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Osteogénesis imperfecta (Enf. de los huesos de cristal) Teckel

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Teckel

Osteopatía craneomandibular (CMO) - Cairn Terrier, Scottish Terrier y West Highland White Terrier

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Cairn Terrier, Scottish Terrier y West Highland White Terrier

Ovino y Caprino, Perfil Infecciosas (Brucelosis Ac, Tuberculosis PCR, Listeria Ac, Clotridium cultivo, Salmonella PCR, Pasteurella PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA, suero y heces (TODAS)

Plazo (días): 7

LABORATORIO Dr. BARBA
C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)
Telf.: 91 364 58 35
Fax: 91 365 88 21

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Oxalato (Ácido Oxálico), orina

Instrucciones:

Plazo (días): 5

Pack 1 cavalier King Charles spaniel: Episodic falling (EF), síndrome dry eye curly coat (CCS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Pack 1 Russell terrier: Enfermedad cerebral juvenil (JBD), ataxia de aparición tardía (LOA), ataxia espinocerebelar (SCA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Russell terrier

Pack 2 cavalier King Charles spaniel: Distrofia muscular (MD), episodic falling (EF), macrotrombocitopenia (MTC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), síndrome dry eye curly coat (CCS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Pack 2 Russell terrier: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), ataxia de aparición tardía (LOA), ataxia espinocerebelar (SCA), enfermedad cerebral juvenil (JBD), luxación primaria de lente (PLL)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Russell terrier

Pack 4 equino (GBED, HERDA, HYPP, EMH)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarab, Quarter horse

Pack 5 equino (GBED, HERDA, HYPP, PSSM, EMH)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarab, Quarter horse

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Pack American bully: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA), cistinuria, hiperuricosuria (HUU/SLC), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: American bully

Pack American Staffordshire terrier: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA) lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), mielopatía degenerativa (DM exón 2), D-locus d1 (dilución)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: American Staffordshire terrier

Pack Basenji: Atrofia progresiva de retina (Bas-PRA1), deficiencia de piruvato quinasa (PK), síndrome de Fanconi

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Basenji

Pack bengalí: Grupo sanguíneo genético, atrofia progresiva de retina (b-PRA), atrofia progresiva de retina (rdAc-PRA), deficiencia de piruvato quinasa (PK)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bengala

Pack birmano: Grupo sanguíneo genético, hipotricosis, mucopolisacaridosis tipo 6 (MPS6), enfermedad renal poliquística (PKD), atrofia progresiva de retina (pd-PRA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Birmano

Pack bobtail: Ataxia hereditaria (HA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), disquinesia ciliar primaria (PCD), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a ivermectina (MDR1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bobtail

Pack Bolonka Zwetna: Atrofia progresiva de retina (cord1-PRA), atrofia progresiva de retina (dilución), furnishing

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bolonka zwetna

Pack border collie: Síndrome de Raine, anomalía ocular del collie (CEA), glaucoma y goniodisgenesis (GG), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), sensibilidad a la ivermectina (MDR-1), síndrome Imlerslund-Gräsbeck (IGS), síndrome del neutrófilo atrapado (TNS), neuropatía sensorial (SN)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Border collie

Pack bosque de Noruega: Grupo sanguíneo genético, enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo 4 (GSD4), deficiencia de piruvato quinasa (PK), ámbar

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bosque de Noruega

Pack boyero australiano: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), cistinuria, lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), luxación primaria de lente (PLL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Boyero australiano

Pack British de pelo corto: Grupo sanguíneo genético, síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS), enfermedad renal poliquística (PKD), Hipotiroidismo Congénito Felino, Cardiomiopatía hipertrófica felina HCM4

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: British shorthair, British longhair

Pack bull terrier: Parálisis laríngea (LP), acrodermatitis letal (LAD), luxación primaria de lente (PLL)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bull terrier

Pack bulldog francés: Catarata hereditaria (HSF4), condrodisplasia y condrodistrofia (CDPA & CDDY, IVDD risk), cistinuria, hipotiroidismo congénito (CHG), mielopatía degenerativa (DM exón 2), retinopatía

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Bulldog francés

Pack bulldog: Cistinuria, hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), retinopatía multifocal canina (CMR1), síndrome Robinow-like (DVL2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Antiguo bulldog inglés, Bulldog continental, Bulldog francés, Bulldog inglés

Pack burmés: Grupo sanguíneo genético, gangliosidosis (GM2), defecto craneal, hipopotasemia

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Burmes

Pack cairn terrier: Deficiencia de piruvato quinasa (PK), leucodistrofia de células globoides (Krabbe disease), macrotrombocitopenia (MTC), osteopatía craneomandibular (CMO)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Cairn terrier

Pack caniche: Atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA y prcd-PRA), encefalopatía neonatal (NEWS), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD-1), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Caniche

Pack carlino: Deficiencia de piruvato quinasa (PK), hipertermia maligna (MH), luxación primaria de lente (PLL), meningoencefalitis necrotizante (NME/PDE), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Carlino

Pack chihuahua: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), crd-PRA (crd4-PRA), crd4-MAP9 y Enfermedad de Lafora

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Chihuahua

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Pack cobrador de pelo rizado: Atrofia progresiva de retina (cord1-PRA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), enfermedad por almacenamiento de glucógeno (GSDIIIa), mielopatía degenerativa (DM Exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Curly coated retriever

Pack cocker spaniel: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), nefropatía familiar (FN), síndrome mutilación acral (AMS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Cocker spaniel inglés

Pack collie: Anomalia ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (rcd2-PRA), enfermedad pulmonar inflamatoria (IPD), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a la ivermectina (MDR-1), dermatomiositis (DMS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Collie

Pack colores de capa bengala: Charcoal, chocolate, cinnamon, diluido, snow

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Bengala

Pack colores de capa gato: Agouti, chocolate, canela, colourpoint, diluido, siamés, burma

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas, Bengala, Maine coon, Birmano, Ragdoll, British shorthair, British longhair, Siamés, Oriental de pelo corto, Persa, Devon rex, Sphynx, Bosque de Noruega, Siberiano, Burmes

Pack Continental Toy Spaniel: Atrofia progresiva de retina (pap-PRA1), deficiencia del factor VII (F7), distrofia neuroaxonal (NAD), mielopatía degenerativa (DM exon 2), von Willebrand tipo 1 (vWD-1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Papillón

Pack crestado chino: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd3-PRA), degeneración sistémica múltiple canina (CMSD), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), luxación primaria degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 15

Razas: Perro crestado chino

Pack Devon Rex: Grupo sanguíneo genético, síndrome miasténico congénito (SMC), longitud de pelo (pelo corto/pelo largo), variante de pelo sphynx / Devon rex (SPH/DRX)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Devon rex

Pack dóbermann: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), narcolepsia, enfermedad de von-Willebrand tipo 1 (vWD-1), B-locus (marrón, chocolate, hígado), D-locus (dilución)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Dobermann

Pack equino, Árabe (CA, LFS, SCID)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Árabe

Pack equino, caballos de sangre templada (WFFS, PSSM)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Warmblood

Pack equino, Paint horse (EMH, GBED, HERDA, HYPP, OLWS, PSSM)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Paint horse

Pack equino, Quarab (CA, GBED, HERDA, PSSM, SCID)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Quarab

Pack equino, Quarter horse / Appaloosa (GBED, HERDA, HYPP, PSSM)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Quarter horse, Appaloosa

Pack Fox terrier: Ataxia espinocerebelar (SCA), hipotiroidismo congénito (CHG), luxación primaria del cristalino (PLL), síndrome de van den Ende-Gupta (VDEGS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Fox terrier

Pack Golden Retriever Plus: Atrofia progresiva de retina (GR-PRA1, GR-PRA2 y prcd-PRA, distrofia muscular (MD), ictiosis (tipo 1 y 2), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), Osteogénesis Imperfecta (GR)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 mL

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Pack golden retriever: Atrofia progresiva de retina (GR-PRA1, GR-PRA2 y prcd-PRA, distrofia muscular (MD), ictiosis (tipo 1 y 2), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Pack Gordon setter: Ataxia hereditaria (HA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Gordon setter

Pack gran boyero suizo: Hemorragia postoperatoria (P2Y12), hipertermia maligna (MH), hiperuricosuria (HUU/ SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), D-locus (d1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Gran boyero suizo

Pack Kromfohrlander: Enfermedad de von Willebrand tipo I (vWD1), hiperqueratosis digital (DH/HEH), hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), variante del gen MDR1 (hipersensibilidad a

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Kromfohlander

Pack labradoodle: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd4 PRA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), displasia esquelética 2 (enanismo) (SD2), encefalopatía neonatal con convulsiones (NEWS), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD1), mielopatía degenerativa (DM exón 2), miopatía hereditaria (CNM), paraqueratosis nasal hereditaria (HNPK)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Labradoodle

Pack Labrador Retriever: Colapso inducido por el ejercicio (EIC), Atrofia progresiva de retina (GTPBP2 - PRA), Displasia de retina (OSD), Miopatía centronuclear (CNM), Hiperqueratosis nasal hereditaria (HNPK), Displasia esquelética o enanismo (SD2), Stargardt disease (degeneración retiniana) (STGD), Mielopatía degenerativa, PK deficiencia de piruvato quinasa, Hiperuricosuria (SLC)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Labrador retriever

Pack Lagotto Romagnolo: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), distrofia neuroaxonal (NAD), epilepsia juvenil (JE), enfermedad de almacenamiento lisosomal del lagotto (LSD), furnishing (pelo duro), hiperuricosuria (HUU/SLC)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Lagotto romagnolo

Pack Landseer: Cistinuria, distrofia muscular (MD), D-locus d1 (dilución), mielopatía degenerativa (DM exón 2), trombopatía

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 10

Razas: Landseer

Pack Leonberger: Parálisis laríngea con polineuropatía tipo 3 (LPPN3), leucoencefalomielopatía (LEMP), polineuropatía del leonberger 1 y 2 (LPN1 y LPN2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Leonberger

Pack maine coon: Grupo sanguíneo genético, deficiencia del factor XI (F11), miocardio deficiencia de piruvato quinasa (PK), atrofia muscular espinal (SMA)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Maine coon

Pack pastor alemán y perro lobo checoslovaco: Enanismo hipofisario, hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), pelo largo/pelo corto, sensibilidad a la ivermectina (MDR1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 1

Razas: Pastor alemán, Perro lobo checoslovaco

Pack pastor australiano y pastor americano miniatura: Anomalía ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), braquiuria, catarata hereditaria (HSF4), hiperuricosuria (HUU/SLC), lipofuscinosis neuronal cerioide (NCL), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a la ivermectina (MDR-1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Pastor australiano, Pastor americano miniatura

Pack pastor belga/holandés: Atrofia del SNC con ataxia cerebelosa (CACA), cardiomiopatía con mortalidad juvenil (CJM), degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 1 (SDCA1), degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 2 (SDCA2), mielopatía degenerativa

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga, Pastor holandés

Pack pastor blanco suizo: Defecto MDR1 (hipersensibilidad a la ivermectina), enanismo hipofisario, mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Pastor blanco suizo

Pack pastor de Shetland: Anomalía ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (BBS2-PRA), atrofia progresiva de retina (CNGA1-PRA), enfermedad de von Willebrand tipo 3 (vWD3), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a ivermectina (MDR-1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: pastor de Shetland

Pack perro cobrador de Nueva Escocia: Anomalía ocular del Collie (CEA), at

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

(prcd-PRA), condrodisplasia (CDPA) y condrodistrofia (CDDY) (riesgo de IVDD), degeneración cerebelosa y miositis (CDMC), labio leporino/ paladar hendido y sindactilia (CLPS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Perro cobrador de Nueva Escocia

Pack Perro de agua irlandés: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD1), D-Locus d1 (dilución), K-Locus

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Perro de agua irlandés

Pack perro de aguas español: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (eo-PRA), braquiuria, distrofia neuroaxonal (NAD), hipotiroidismo congénito (CHG), mielopatía degenerativa (DM exón 2), Hiperuricusuria (HUU)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Perro de agua español

Pack perro de aguas portugués: Atrofia progresiva de retina de aparición temprana (eo-PRA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), gangliosidosis (GM1), improper coat

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Perro de agua portugués

Pack persa: Grupo sanguíneo genético, alfa-manosidosis (AMD), enfermedad renal poliquística (PKD), atrofia progresiva de retina (pd-PRA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Persa

Pack pointer alemán de pelo corto: Enfermedad de von Willebrand tipo 2 (vWD 2), epidermolisis bullosa juntural (JEB), lupus eritematoso exfoliativo cutáneo (ECLE), síndrome de mutilación acral (AMS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Braco alemán de pelo corto

Pack pomerania: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA), mucocoele biliar, raquitismo vitamínico

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Pomerania

Pack ragdoll: Grupo sanguíneo genético, miocardiopatía hipertrófica (HCM1, HCM3), enfermedad renal poliquística (PKD), atrofia progresiva de retina (pd-PRA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Ragdoll

Pack retriever de la bahía de Chesapeake: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Retriever de la bahía de Chesapeake

Pack rhodesian ridgeback: Mielopatía degenerativa (DM exón2), hemofilia B (deficiencia de factor IX), sordera hereditaria (EOAD), epilepsia juvenil mioclónica (JME), B-locus (hígado (nariz)), D-locus d1 (dilución)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Rhodesian ridgeback

Pack rottweiler: Leucoencefalomielopatía (LEMP), mielopatía degenerativa (DM exón 2), distrofia neuroaxonal (NAD), miopatía ligada al cromosoma X (XL-MTM), parálisis laríngea juvenil y polineuropatía (JLPP), longitud del pelo I (pelo corto/pelo largo)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Rottweiler

Pack schnauzer gigante: Atrofia progresiva de retina (NECAP1-PRA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), cardiomiopatía dilatada (DCM), hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Schnauzer gigante

Pack schnauzer mini: Neuropatía Charcot-Marie-Tooth (CMT), sensibilidad al complejo M, miotonía congénita, síndrome conducto mülleriano persistente (PMDS), atrofia progresiva (HIVEP3), disostosis espondilocostal (comma defect)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

Pack Setter Inglés: crd4-PRA, crd4-MAP9 y Lipofuscinosis Neuronal Ceroide 8 (NCL8)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Setter inglés

Pack setter irlandés (rojo y blanco): Atrofia progresiva de retina (rcd1-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), deficiencia de adhesión leucocitaria (CLAD), leucodistrofia de células globoides (Krabbe)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Setter irlandés

Pack shiba inu: GM1-Gangliosidosis (GM1), GM2-Gangliosidosis (GM2), A-locus, E-locus

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Shiba inu

Pack siamés/oriental: Grupo sanguíneo genético, gangliosidosis (GM1), mucopolisacaridosis tipo 6 (MPS6), glaucoma congénito primario (PCG), atrofia progresiva de retina (rdAc-PRA)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Siamés, Oriental de pelo corto

Pack siberiano: Grupo sanguíneo genético, deficiencia de piruvato quinasa (PK), colourpoint, dilución

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Siberiano

Pack soft-coated wheaten terrier irlandés: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), hiperuricosuria (HUU/SLC), microftalmia (RBP4), disquinesia paroxisomal (PxD), nefropatía perdedora de proteínas (PLN)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Irish soft-coated wheaten terrier

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Pack Sphynx: Grupo sanguíneo genético, Miocardiopatía Hipertrófica (HCM4), Enfermedad Renal Poliquística (PKD), Síndrome Miasténico Genético (CMS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Devon rex, Sphynx

Pack Teckel: Osteogénesis imperfecta, Atrofia progresiva de retina PRA crd4 y PRA crd, Lipofuscinosis neuronal ceroides 2 (NCL2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Teckel

Pack terrier negro ruso: Hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM Exon 2), parálisis laríngea y polineuropatía (JLPP)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 10

Razas: Terrier negro ruso

Pack terrier tibetano: Atrofia progresiva de retina (PRA3), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), enanismo pituitario, lipofuscinosis neuronal ceroides (NCL), luxación primaria de lente (PLL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Tibetan terrier

Pack vizsla: Abiotrofia cerebelosa cortical neonatal (NCCD), lupus eritematoso cutáneo exfoliativo (ECLE), mielopatía degenerativa (DM exón 2), longitud de pelo I (pelo largo o corto), furnishing

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Vizsla

Pack weimaraner: Disrafismo espinal (NTD), hipomielinización (síndrome del cachorro temblador) (SPS), mielopatía degenerativa (DM Exón 2)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Weimaraner

Pack Welsh corgi: Atrofia progresiva de retina (rcd3-PRA), braquiuria, enfermedad de von Willebrand

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Corgi galés de Pembroke

Pack Yorkshire terrier: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), condrodisplasia y condrodistrofia (CDPA y CDDY, riesgo IVDD), encefalopatía necrotizante subaguda (SNE). L-2-hidroxiglutaraciduria (L-2-HGA), luxación primaria del cristalino (PLL)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Yorkshire terrier

Pancreático canino, perfil (Hemograma, amilasa, lipasa, glucosa, calcio, urea, triglicéridos, colesterol, almidón fecal, grasa fecal, digestión de proteínas, pH fecal, tripsina fecal, Vitamina B12, Ácido Fólico, PLI canina)

Instrucciones: sangre con EDTA, suero en ayunas y heces

Plazo (días): 3

Pancreático completo canino, perfil (Hemograma, amilasa, lipasa, glucosa, calcio, urea, triglicéridos, colesterol, almidón fecal, grasa fecal, digestión de proteínas, pH fecal, tripsina fecal, TLI en suero, Vitamina B12, Ácido Fólico, PLI canina, Proteína C reactiva)

Instrucciones: sangre con EDTA, suero en ayunas y heces

Plazo (días): 7

Pancreático completo felino, perfil (Hemograma, amilasa, lipasa, glucosa, calcio, urea, triglicéridos, colesterol, almidón fecal, grasa fecal, digestión de proteínas, pH fecal, tripsina fecal, TLI en suero, Vitamina B12, Ácido Fólico, PLI felina, Proteína C reactiva)

Instrucciones: sangre con EDTA, suero en ayunas y heces

Plazo (días): 10

Pancreático felino, perfil (Hemograma, amilasa, lipasa, glucosa, calcio, urea, triglicéridos, colesterol, almidón fecal, grasa fecal, digestión de proteínas, pH fecal, tripsina fecal, Vitamina B12, Ácido Fólico, PLI felina)

Instrucciones: sangre con EDTA, suero en ayunas y heces

Plazo (días): 3

Paneles alérgenos equinos (sin screening)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Panleucopenia felina IgG (IFI)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Panleucopenia felina PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, heces o tejido intestinal

Plazo (días): 4

Panleucopenia IgM

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Panóptico rápido num. 1 500 ml

Instrucciones:

Plazo (días): 5

Panóptico rápido num. 2 500 ml

Instrucciones:

Plazo (días): 5

Panóptico rápido num. 3 500 ml

Instrucciones:

Plazo (días): 5

pap-PRA1

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Papillón

Papera equina PCR (Streptococcus equi)

Instrucciones: Fluidos corporales, hisopo (sin medio o medio transparente) nasal, sangre con EDTA.

Plazo (días): 3

Papilomavirus canino PCR

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: piel (zona afectada)
Plazo (días): 6

Paracetamol en suero

Instrucciones: 1 ml suero refrigerado
Plazo (días): 4

Parainfluenza bovina tipo 3 PCR

Instrucciones: hisopos respiratorios sin medio
Plazo (días): 5

Parainfluenza bovino Ac totales

Instrucciones: suero
Plazo (días): 3

Parainfluenza canina PCR

Instrucciones: hisopo con medio Amies o Stuart
Plazo (días): 7

Parainfluenza caprino y ovino tipo 3 PCR

Instrucciones: hisopos respiratorios sin medio
Plazo (días): 5

Parálisis laríngea (LP) Bull terrier RAPGEF6

Instrucciones:
Plazo (días): 0
Razas: Bull terrier

Parálisis Laríngea (LP)(Bull Terrier, Miniature Bull Terrier)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 14

Parálisis laríngea con polineuropatía tipo 3 (LPPN3)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin n
Plazo (días): 10

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Leonberger, Labrador retriever, San Bernardo

Parálisis laríngea juvenil & polineuropatía (JLPP, Rottweiler, terrier ruso negro)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Parálisis laríngea juvenil y polineuropatía (JLPP)

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Rottweiler, Terrier negro ruso

Parálisis periódica hipercalcémica equina (HYPP)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

Parálisis periódica hipokalémica felina (Burmese)

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Burmes

Paramixovirus PCR

Instrucciones: Hisopo sin medio de tráquea o cloaca o ambos

Plazo (días): 7

Paraqueratosis nasal hereditaria (HNPK)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Labrador retriever, Labradoodle

Parásitos en lavado bronquial

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Parásitos grandes cuantitativo (incluye digestivos, pulmonares y criptosporidios)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: heces
Plazo (días): 1

Paratuberculosis anticuerpos IgG

Instrucciones: suero
Plazo (días): 3

Paratuberculosis PCR

Instrucciones: tejido, hisopo (sin medio o medio transparente) oral, comida, agua, leche, pienso, sangre, heces, nódulo linfático, tracto digestivo y cama
Plazo (días): 3

Parvovirus canino antígeno heces

Instrucciones: heces
Plazo (días): 1

Parvovirus canino IgG

Instrucciones: IgM (IFI) suero
Plazo (días): 1

Parvovirus canino IgM

Instrucciones: IgG (IFI) suero
Plazo (días): 1

Parvovirus equino

Instrucciones: Sangre EDTA, suero
Plazo (días): 10
Razas: todas las razas de caballo

Parvovirus PCR (detección ADN)

Instrucciones: heces o sangre con EDTA
Plazo (días): 4

Parvovirus porcino

Instrucciones: suero

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 5

Parvovirus Porcino PCR

Instrucciones: Heces, sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Parvovirus test rápido 2 unidades

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Parvovirus test rápido 5 unidades

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Pasteurella PCR

Instrucciones: Tejido, exudado o sangre con EDTA

Plazo (días): 4

Paternidad bovina (Incluye 1 parental y 1 descendiente) y Comparativa

Instrucciones: sangre EDTA 1 ml

Plazo (días): 21

Paternidad bovina (Incluye 2 parentales y 1 descendiente) y Comparativa

Instrucciones: sangre EDTA 1 ml

Plazo (días): 21

Paternidad Canina (incluye un cachorro y dos padres)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL/ hisopos especiales enviados por el laboratorio

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Paternidad Canina cachorro adicional

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL/ hisopos especiales enviados por el laboratorio

Plazo (días): 21

Razas: todas las razas

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Paternidad equina (Incluye perfil ADN de 2 parentales y 1 descendiente y la comparativa)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 21

Paternidad Felina (Incluye un cachorro y el presunto padre)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 21

pelo largo/pelo corto, sensibilidad a la ivermectina (MDR1)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán, Perro lobo checoslovaco

Pepsinógeno 1 suero

Instrucciones:

Plazo (días): 30

Perfil ADN/genético equino

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 30

Perfil Anticuerpos vacunales felino

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Perfil de ADN (Identidad, huella digital)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Perfil Diagnostico Insulinoma

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Perfil diarrea canino (real time PCR Distemper, Coronavirus, Parvovirus, Clostridium perfringens , Cryptosporidium spp ., Giardia spp . y Salmonella spp .)

Instrucciones: heces

Plazo (días): 5

Perfil diarrea rumiantes en heces(Parásitos, Rotavirus, Coronavirus, Cryptosporidium parvum, Salmonella PCR con sonda ADN, Escherechia coli, Clostridios, Giardia sp. antígeno, coccidios, Campylobacter spp. PCR)

Instrucciones: heces

Plazo (días): 5

Perfil diarrea vírica canina en heces (Parvovirus, Coronavirus y Rotavirus)

Instrucciones: heces

Plazo (días): 1

Perfil disbiosis equino PCR: Recuento cuantitativo de microbioma

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas

Perfil Ehrlichia PCR + Anaplasma PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, Médula ósea.

Plazo (días): 5

Perfil endocrino hurón (17 dihidroxiprogesterona, DHEA, Estradiol 17 beta)

Instrucciones: suero centrifugado 1 ml

Plazo (días): 8

Perfil Endocrino: 3 pruebas hormonales a elegir, de precio igual o inferior a 16 €. Ej: Cortisol/Creatinina en orina, T4 total, Estradiol, Progesterona

Instrucciones: suero y orina (si se pide cortisol/creatinina)

Plazo (días): 1

Perfil enfermedades respiratorias bovino (IBR PCR, BVD PCR, BRSV PCR, PI3 Ac, Pasteurella PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA, heces y exudado nasal o pulmón y sangre con E

Plazo (días): 10

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Perfil equino que incluye además bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ionograma (Calcio, Fósforo, Sodio, Potasio, Cloro), Fibrinógeno, GLDH y SDH.

Instrucciones: sangre con EDTA, suero y plasma con citrato

Plazo (días): 10

Perfil garrapata

Instrucciones: suero o plasma

Plazo (días): 1

Perfil genético aves

Instrucciones: Plumas (5-10) o sangre en tubo especial

Plazo (días): 20

Perfil genético aves

Instrucciones: Plumas (5-10) o sangre en tubo especial

Plazo (días): 20

Perfil Geriátrico canino o felino SIN Troponina I (Hemograma, Albúmina, ALT, AST, Bilirrubina, Colesterol, Creatinina, Creatinquinasa, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, Glucosa, Globulinas, Proteínas totales, Cociente A/G, Triglicéridos, Urea, T4 total)

Instrucciones: suero 1 ml y EDTA 0.5 ml

Plazo (días): 1

Perfil infecciosas equino (Fiebre del Nilo PCR, Arteritis Ac, Rinoneumonitis Ac, Influenza PCR, Anemia infecciosa Ac, Babesia caballi Ac, Theileria equi Ac)

Instrucciones: sangre con EDTA (0.5 ml), suero (1 ml) e hisopo nasal sin carbón activo

Plazo (días): 5

Perfil leucemia caniPno (Hemograma+Frotis+Citometria de flujo+PARR)

Instrucciones: 3ml sangre con EDTA + Frotis sanguíneo sin fijar ni teñir

Plazo (días): 1

Perfil leucemia felino (Hemograma+Frotis+Felv+Fiv+PARR)

Instrucciones: 3ml sangre con EDTA + Frotis sanguíneo sin fijar ni teñir

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Perfil Muscular Equino (Hemograma, GOT, GGT, CPK, LDH, Sodio, Potasio)

Instrucciones: suero y sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA

Plazo (días): 1

Perfil neurológico

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml y suero centrifugado (0.5 ml)

Plazo (días): 3

Perfil neurológico canino (Moquillo PCR, Neospora IgG, Toxoplasma IgG, Criptococcus PCR, Ehrlichia IgG, Calcio, Glucosa)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml, suero centrifugado 0.5 ml y orina (15 ml)

Plazo (días): 3

Perfil PCR (se puede solicitar cualquier PCR de infecciosas de nuestro listado, cobrándose la de mayor precio más 15 euros por cada PCR adicional)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Perfil tiroideo felino (T4 total, T4 libre, TSH sólo especie felina y colesterol)

Instrucciones: 0.5 ml de suero centrifugado o 1 ml de sangre

Plazo (días): 5

Perfil tortugas PCR (Mycoplasma spp. + Herpesvirus)

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Peritonitis infecciosa felina IgG-PIF (IFI) Tipo 1

Instrucciones: Suero, edta, heparina, plasma, líquido ascítico

Plazo (días): 1

Peritonitis infecciosa felina IgG-PIF (IFI) Tipo 2

Instrucciones: Suero, edta, heparina, plasma, líquido ascítico

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Peritonitis infecciosa felina IgM-PIF (IFI) Tipo 1

Instrucciones: Suero, edta, heparina, plasma, líquido ascítico

Plazo (días): 1

Peste Equina Africana

Instrucciones: 1ml suero refrigerado

Plazo (días): 20

PH (agua)

Instrucciones: agua

Plazo (días): 1

ph en ensilado

Instrucciones: prod original 20 grs

Plazo (días): 4

ph en silo avena

Instrucciones: 200 grs

Plazo (días): 10

pH líquido

Instrucciones:

Plazo (días): 1

PH orina

Instrucciones: orina

Plazo (días): 1

pH suero

Instrucciones: 1 ml suero refrigerado

Plazo (días): 1

Picornavirus tortuga

Instrucciones: Hisopo sin medio o 0.2 ml de sangre con EDTA

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

PIF, perfil para diagnóstico de, líquido ascítico o pleural

Instrucciones: líquido ascítico o pleural (5 mL)

Plazo (días): 5

PIF, perfil para diagnóstico de, sangre o suero (IgG de PIF-1, IgG de PIF-2, Amiloide sérico tipo A (proteína amiloide, marcador inflamatorio) y Cociente albúmina/globulinas)

Instrucciones: sangre con EDTA (0.5 ml) y suero (1 ml)

Plazo (días): 1

PIF, Perfil Tipo 1 y 2 (Peritonitis infecciosa felina IgG - PIF (IFI) Tipo 1 y Peritonitis infecciosa felina IgG - PIF (IFI) Tipo 2)

Instrucciones: suero, edta, heparina, plasma, líquido ascítico

Plazo (días): 1

Piretroides o Permetrinas (20 sustancias)

Instrucciones: Cebo, pienso, sangre EDTA, agua, orina, órganos (hígado, riñón, pulmón), contenido gástrico.
MUESTRAS CONGELADAS Y SIN FORMOL (sangre EDTA y orina refrigerados)

Plazo (días): 7

Piruvato Kinasa eritrocitaria sangre

Instrucciones: 0.5 ml de sangre con EDTA

Plazo (días): 1

Piruvato Kinasa suero

Instrucciones: EDTA o Heparina

Plazo (días): 1

PK Deficiencia de la piruvato kinasa eritrocítica en gatos

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 8

Razas: Abisinio, Somalí, Bengala, Mau egipcio, LaPerm, Maine coon, Bosque de Noruega, Savannah, Siberiano, Singapura, European shorthair, Domestic longhair, Australian mist, Toyger, Exotic shorthair, Tonquinés, Asian, Ocicat, Russian blue, Highlander, Lykoi, Minuet, Munchkin, Neva masquerade, Pixiebob

PK Deficiencia de piruvato quinasa en perro

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin n

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 7

Razas: Basenji, Beagle, Cairn terrier, Carlino, Labrador retriever, West highland white terrier

PKD PCR (Riñón poliquístico)

Instrucciones: sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de raspado bucal

Plazo (días): 7

Razas: British shorthair, British longhair, Chartreux, Exótico de pelo corto, Persa, Ragdoll, Sagrado de Birmania, Scottish fold, Selkirk rex, Sphynx, Maine coon

Plaguicidas (pienso)

Instrucciones: 100 grs pienso

Plazo (días): 10

Plantas Tóxicas Producción

Instrucciones: Cebo, pienso, sangre EDTA, agua, orina, órganos (hígado, riñón, pulmón), contenido gástrico.
MUESTRAS CONGELADAS Y SIN FORMOL (sangre EDTA y orina refrigerados)

Plazo (días): 7

Plaquetas (recuento manual)

Instrucciones:

Plazo (días): 2

Plasminógeno

Instrucciones: Plasma citratado 1 ml

Plazo (días): 3

Plasmodium ssp. (Malaria) PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, hígado, biopsia hepática

Plazo (días): 5

Plátano

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Pleural felina, análisis de efusión (LDH, Proteínas totales, Glucosa, Albúmina, Cociente a

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

celular, Extensión, Cultivo)

Instrucciones: Efusión pleural 1 ml

Plazo (días): 1

Pleuroneumonía Porcina (*Actinobacillus pleuropneumoniae* Ac)

Instrucciones: suero 1ml

Plazo (días): 7

PLI (Inmunorreactividad de la Lipasa Pancreática) canina

Instrucciones: 200 ul suero

Plazo (días): 1

PLI Felina (Inmunorreactividad de la Lipasa Pancreática)

Instrucciones: 200 ul suero

Plazo (días): 1

Plomo

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml

Plazo (días): 10

Plomo (cualitativo)

Instrucciones:

Plazo (días): 3

plomo alimentos/agua

Instrucciones: agua 500 ml indicar procedencia

Plazo (días): 10

Plomo pienso

Instrucciones: 50 grs pienso

Plazo (días): 10

Plomo(hueso ave)

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Polineuropatía del alaskan malamute (AMPN)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 10
Razas: Alaskan malamute

Polineuropatía tipo 1 del leonberger (LPN1)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Leonberger

Polineuropatía tipo 2 del leonberger (LPN2)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Leonberger

Poliomavirus PCR (detección de DNA)

Instrucciones: sangre sin centrifugar y con EDTA, heces, pluma o hisopado (sin medio o medio transparente)
cloacal
Plazo (días): 4

Poliovirus Anticuepos (simios)

Instrucciones:
Plazo (días): 1

Poliuria/Polidipsia, perfil (Hemograma, urea, creatinina, GOT, GPT, proteínas totales, fosfatasa alcalina, glucosa, albúmina, fructosamina, globulinas, cociente albúmina/globulinas, sistemático de orina, cortisol/creatinina orina)

Instrucciones: sangre con EDTA, suero y orina
Plazo (días): 2

Polvo de cereales

Instrucciones:
Plazo (días): 1

Potasio (pienso)

Instrucciones: 50 grs pienso

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

Potasio líquido

Instrucciones: líquido ascítico y otros exudados o trasudados

Plazo (días): 1

PRA Cord1 (Distrofia de retina)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Curly coated retriever, Dachshund, English springer spaniel, Bolonka zwetna

PRA dominante

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Bullmastiff, Mastín inglés

PRA generalizada

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Schapendoes

PRA Tipo B1, HIVEP3

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

PRA4

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Lhasa apso

Primidona suero

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Procalcitonina

Instrucciones: suero, plasma con EDTA o heparina 0.5mL

Plazo (días): 2

Productos de degradación del fibrinógeno

Instrucciones: plasma citratado

Plazo (días): 5

Progesterones en heces

Instrucciones: heces mínimo 5 grs

Plazo (días): 1

Prolactina cabra

Instrucciones: sangre o suero 1 mL

Plazo (días): 3

Prolactina equina

Instrucciones: suero 1mL

Plazo (días): 3

Prolactina veterinaria

Instrucciones: suero o plasma 0.5 ml

Plazo (días): 5

Proteína beta amiloide marcadores A(del 1 al 42)

Instrucciones: 1 ml de LCR

Plazo (días): 20

Proteína bruta

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Proteína bruta pienso

Instrucciones: 100 grs pienso

Plazo (días): 10

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Proteína C reactiva (canino, felino y ovino)

Instrucciones: 500 ul suero

Plazo (días): 1

Proteína C reactiva (oso hormiguero)

Instrucciones: sangre con o sin aditivo (0.5 mL)

Plazo (días): 1

Proteína C reactiva (porcino)

Instrucciones: suero o plasma 0.5 ml

Plazo (días): 3

Proteína C reactiva equino

Instrucciones: suero 0.5 mL

Plazo (días): 1

Proteína de Bence Jones

Instrucciones: 10 ml de orina de 24 h refrigerada

Plazo (días): 7

Proteína digestible

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Proteína leche

Instrucciones: 20 ml leche con conservante ,1 pastilla/100ml(solicitar al laboratorio)

Plazo (días): 5

Proteína relacionada con la PTH

Instrucciones: 1 ml de plasma de EDTA

Plazo (días): 15

Proteínas LCR

Instrucciones: LCR

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

Proteinograma LCR

Instrucciones: 1 ml LCR refrigerado

Plazo (días): 3

Proteinograma líquido

Instrucciones: Líquido

Plazo (días): 4

proteinograma orina

Instrucciones: orina(2 ml)

Plazo (días): 4

Protrombina, perfil (Tiempo de protrombina y Actividad de protrombina)

Instrucciones: plasma citratado

Plazo (días): 1

PRRS (Síndrome Respiratorio y Reproductor Porcino)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 5

PRRSV (Síndrome Respiratorio y Reproductor Porcino) PCR

Instrucciones: Material aborto, tejido, hisopo sin medio

Plazo (días): 7

Prueba cruzada de Coombs

Instrucciones: sangre con edta 0.5ml

Plazo (días): 1

Prueba bioquímica añadida a un perfil

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Prueba de descendencia equina (paternidad) Comparación de perfiles ADN de cada descendiente (no se incluye perfil de ADN)

Instrucciones: Perfil de ADN

Plazo (días): 21

Razas: todas las razas de caballo

Prueba de descendencia felina - paternidad: comparación de perfiles ADN de cada descendiente (no se incluye perfil de ADN)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Pruebas varias 2

Instrucciones:

Plazo (días): 1

PSSM (Miopatía del almacenamiento de polisacáridos tipo 1) sp. equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas, Quarab, Paint horse, Quarter horse, Appaloosa, Warmblood

PTH intacta (muestra veterinaria)

Instrucciones: suero /plasma EDTA centrifugado y refrigerado, máximo 24 horas para suero y 48 horas para EDTA. Si es más tiempo se requiere sistema de transporte para muestras congeladas, solicitar al laboratorio

Plazo (días): 5

Punto crioscópico de la leche

Instrucciones: 50 ml leche congelada y sin conservante

Plazo (días): 4

Quimotripsina fecal

Instrucciones: heces

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Rabia Ac

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 30

Rabia anticuerpos

Instrucciones: 0.5 ml suero

Plazo (días): 15

Rabia anticuerpos (con certificado oficial, válido para viajar. VACUNACION 1 MES ANTES DE LA EXTRACCION)

Instrucciones: mínimo 0.5 ml suero centrifugado

Plazo (días): 30

Rabia duplicado

Instrucciones: suero centrifugado

Plazo (días): 1

Rabia PCR

Instrucciones: Saliva, tejido nervioso o sangre sin heparina (poco recomendado)

Plazo (días): 3

Raquitismo vitamina D dependiente (VDR)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Pomerania

Ratio Ácidos biliares/creatinina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Ratio Calcio/Creatinina en orina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Ratio Creatinina fluido abdominal : Creatinina plasmática

Instrucciones: Fluido abdominal y suero o plasma

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

Ratio Fósforo/creatinina en orina

Instrucciones: orina

Plazo (días): 1

Ratio GGT/Creatinina orina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Ratio Metanefrina/Creatinina y Normetanefrina/Creatinina orina

Instrucciones:

Plazo (días): 14

Ratio Potasio fluido abdominal : Potasio plasmático

Instrucciones: Fluido abdominal y suero o plasma

Plazo (días): 1

Ratio Potasio/Creatinina orina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Ratio Sodio:Potasio

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Ratio Urea/Creatinina orina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Raza, clasificación genética (perro)

Instrucciones: 0.5 ml sangre con EDTA

Plazo (días): 35

Razas: American staffordshire terrier, Border collie, Boxer, Boyero de Berna, Bullmastiff, Bull terrier, bulldog, Doberman, Dogo argentino, Dogo de Burdeos, English springer spaniel, Fila brasileiro,

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

de pelo duro, Golden retriever, Gran danés, Bichón habanero, Labrador retriever, Terranova, Parson Russell terrier, Pastor australiano, Perro de presa canario, Caniche, Carlino, Mastín del Pirineo, Rhodesian ridgeback, Rottweiler, Mastín español, Staffordshire bull terrier, Weimaraner

rcd1-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Setter irlandés, Setter irlandés rojo y blanco

rcd1a-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Sloughi

rcd2-PRA

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 20

Razas: Collie

rcd3-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Corgi galés de Pembroke, Perro crestado chino, Pomerania

rcd4-PRA canina

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Gordon setter, Setter irlandés, Perdiguero danés, Pastor polaco de tierras bajas, Pastor polaco del Tatra, Tibetan terrier, Boyero australiano, Labradoodle, Caniche

Receptores de la Acetil Colina (Anticuerpos frente a Miastenia gravis) (sp. canina y felina)

Instrucciones: 1 ml suero (6 semanas sin tomar corticoides)

Plazo (días): 10

Recuento celulas somaticas automatico en leche(citometria de flujo)

Instrucciones: 20 ml leche con conservante

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 7

Recuento mohos y levaduras en silo avena

Instrucciones: 200 grs

Plazo (días): 10

Relación BUN-creatinina en sangre

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Renina

Instrucciones: plasma edta congelado 0.4 ml

Plazo (días): 10

Renina actividad plasma

Instrucciones: plasma EDTA congelado 2 ml

Plazo (días): 5

Reovirus Aviar PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, hisopo (sin medio o medio transparente) nasal o respiratorio, heces, fluidos corporales y alimento

Plazo (días): 5

Respiratorio aviar, perfil (Bronquitis infecciosa, avibacterium paragallinarum, laringotraqueítis aviar, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae y Newcastle) PCR

Instrucciones: exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmón

Plazo (días): 1

Respiratorio equino, perfil (Influenza equina PCR, Herpesvirus equino 1 PCR, Herpesvirus equino 4 PCR, Streptococcus equi PCR)

Instrucciones: dos hisopos nasales

Plazo (días): 3

Retinopatía multifocal canina (CMR1)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin r

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 15

Razas: Pastor australiano, Boerboel, Bulldog americano, Bulldog francés, Bulldog inglés, Bullmastiff, Cane corso, Dogo canario, Dogo de Burdeos, Mastín inglés, Perro de montaña de los Pirineos, Pastor americano miniatura

Rickettsia felis IgG

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Rickettsia rickettsii IgG (IFI)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Rickettsia rickettsii/conori IgM

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Rinoneumonitis Equina Anticuerpos (Herpesvirus equino tipo 1 y 4, no diferenciados)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

Rodenticidas anticoagulantes (toxicología)

Instrucciones: cebo, contenido gástrico o hígado

Plazo (días): 7

Rodococcus PCR

Instrucciones: Hisopo (sin medio o medio transparente) nasal o faringeo y heces

Plazo (días): 7

Rotavirus bovino heces

Instrucciones: heces

Plazo (días): 2

Rotavirus canino heces

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Rotavirus PCR (Bovino, porcino, equino, canino, felino, pollos y pavos, primates)

Instrucciones: Heces, hisopo (sin medio o medio transparente) heces

Plazo (días): 3

SA (ataxia esquelética)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Caballo miniatura, Shetland

SAA (Amiloide sérico) canino

Instrucciones: suero 1mL

Plazo (días): 3

Salmonella agua

Instrucciones: 200 ml agua

Plazo (días): 4

Salmonella alimentos

Instrucciones: Mínimo 25 gramos

Plazo (días): 5

Salmonella serotipado (por cepa)

Instrucciones:

Plazo (días): 10

Salmonellosis (Salm. Typhimurium)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Salmonellosis Ac suero

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Salmonellosis heces

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: heces
Plazo (días): 3

Samonella abortus equi

Instrucciones: suero 1 ml
Plazo (días): 1

sangre con EDTA 1mL

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 10
Razas: Boyero de Berna

Sarcoide equino (Papilomavirus)

Instrucciones: Piel / Costra
Plazo (días): 1

Sarcoptes anticuerpos

Instrucciones: 500 ul suero
Plazo (días): 4

Sarcoptes PCR

Instrucciones: Raspado de piel y sangre (Menos recomendado) con EDTA
Plazo (días): 3

SCC (carcinoma de células escamosas ocular)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15
Razas: Tiro belga, Haflinger

Schmallenberg, Enfermedad de

Instrucciones:
Plazo (días): 10

SCID (Inmunodeficiencia combinada severa) equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 15

Razas: Árabe

SDH (Sorbitol Deshidrogenasa)

Instrucciones: suero o Plasma

Plazo (días): 7

Secuenciación de fragmentos (Producto de PCR)

Instrucciones:

Plazo (días): 15

Selenio alimentos

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Selenio pienso

Instrucciones: 100 grs pienso

Plazo (días): 15

Sensibilidad al complejo Mycobacterium avium (MAC)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

Serológico/Inmunológico, perfil (IgG, IgM o antígeno de cualquier prueba infecciosa), 4 pruebas, cada prueba adicional son 7,21 euros más

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Serotonina

Instrucciones: plasma con EDTA 2 ml

Plazo (días): 4

Servicio inmediato Madrid

Instrucciones:

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 1

Sexado Aves Ratites

Instrucciones: EDTA o plumas arrancadas

Plazo (días): 5

Sexado de aves (excepto ratites), no incluye transporte

Instrucciones: pluma en crecimiento o sangre en tubo de EDTA

Plazo (días): 7

Sexaje cromosómico canino

Instrucciones: 1 ml de sangre con EDTA

Plazo (días): 20

Shigella

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Sílice en agua

Instrucciones: Agua (50 ml)

Plazo (días): 1

Síndrome autoinflamatorio del shar pei (SPAID) o fiebre familiar del Sharpei

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Shar Pei

Síndrome conducto mülleriano persistente (PMDS)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

Síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin n

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Dálmata

Síndrome de Fanconi

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Basenji

Síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS) (Malabsorción selectiva de Cobalamina) Border Collie y New Zealand Heading Dog

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Border collie, New Zealand heading dog

Síndrome de mutilación acral (AMS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Cocker spaniel inglés, Braco alemán de pelo corto, Pointer inglés, Spaniel francés, English springer spaniel

síndrome de mutilación acral (AMS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: English springer spaniel

Síndrome de Van den Ende-Gupta (VDEGS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Toy fox terrier, Fox terrier

Síndrome de vías respiratorias altas (UAS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Norwich terrier

Síndrome del Neutrófilo Atrapado (TNS): Border Collie, Huntaway y New Zealand Heading Dog

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Border collie, Huntaway, New Zealand heading dog

Síndrome Dry Eye Curly Coat (Cavalier king charles spaniel)

Instrucciones: 0,5 ? 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 20

Razas: Cavalier king charles spaniel

Síndrome Gray Collie (Neutropenia Cíclica Canina)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 16

Síndrome intestinal del Lundehund (LHS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Lundehund noruego

Síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: British shorthair, British longhair

Síndrome miasténico congénito (CMS) - Devon Rex y Sphynx

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 7

Razas: Devon rex, Sphynx

SMA (Atrofia Muscular Espinal Felina)

Instrucciones: sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso)

Plazo (días): 15

Razas: Maine coon

Sodio (pienso)

Instrucciones: 50 grs pienso

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Sodio en agua

Instrucciones: Agua (50 ml)

Plazo (días): 1

Soja pienso

Instrucciones:

Plazo (días): 7

sólidos en suspensión

Instrucciones: agua

Plazo (días): 10

Solución de May-Grünwal

Instrucciones:

Plazo (días): 21

Somatomedina C (sp. canina/felina)

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 7

Sordera de inicio en edad adulta (AOD)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 1

Sordera hereditaria (PTPRQ)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Beauceron, Dobermann, Rhodesian ridgeback, Rottweiler

Sordera hereditaria del Rhodesian Ridgeback

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: Rhodesian ridgeback

Streptococcus equi Ac

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: suero o plasma 0.5 ml
Plazo (días): 8

Sulfamidas (leche)

Instrucciones:
Plazo (días): 7

Sulfato de Estrona

Instrucciones: suero centrifugado (5 mL mínimo) u orina (5 mL mínimo)
Plazo (días): 5

Sulfatos en agua

Instrucciones: Agua (50 ml)
Plazo (días): 1

Sulfuros (agua)

Instrucciones: 300 ml agua
Plazo (días): 8

Superficie Bacterias aerobias

Instrucciones: cultivo en AS en placa Rodac
Plazo (días): 1

Superficie Enterobacterias

Instrucciones: cultivo en agar Mackonkey en placa Rodac
Plazo (días): 1

Superficies, análisis microbiológico

Instrucciones:
Plazo (días): 5

Superficies, análisis microbiológico (a partir de 6 m)

Instrucciones:
Plazo (días): 5

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Suxametonio cloruro suero

Instrucciones:

Plazo (días): 10

T4 libre por diálisis.

Instrucciones: 1 ml suero congelado

Plazo (días): 18

T4 total:TSH canina, ratio

Instrucciones: suero o plasma (0.5 ml)

Plazo (días): 1

Tape Station HS

Instrucciones: ADN

Plazo (días): 7

Taylorella cultivo

Instrucciones: hisopo con medio amies carbon (negro)

Plazo (días): 7

TDS (sólidos disueltos totales)

Instrucciones: agua 100 mL

Plazo (días): 1

TEAC (capacidad total antioxidante equivalente a Trolox)

Instrucciones: suero, otras muestras biológicas

Plazo (días): 15

Teobromina

Instrucciones: 100 grs pienso

Plazo (días): 10

Testosterona libre equina

Instrucciones: suero 0.5mL

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 2

Tetracaína suero

Instrucciones:

Plazo (días): 10

Timidina Quinasa 1 proteína (TK1)

Instrucciones: 0,5 ml suero

Plazo (días): 1

Tinción adicional a biopsia Ziehl-Neelsen

Instrucciones: Biopsia previa

Plazo (días): 1

Tinción Ziehl-Neelsen

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Tipificación bacteriana

Instrucciones:

Plazo (días): 5

Tiras de orina envase 100 test 10 parámetros

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Tiroideo Control Canino, Perfil (Hemograma, Creatinina, GPT, Fosfatasa Alcalina, Colesterol, Triglicéridos, Proteínas totales, Albúmina, Globulinas, Cociente Albúmina/Globulinas, Glucosa, T4 total, TSH canina, SDMA)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y suero (1 ml)

Plazo (días): 4

Tiroideo Control Felino, Perfil (Hemograma, Creatinina, GPT, Glucosa, Proteínas totales, Albúmina, Globulinas, Cociente A/G, Fosfatasa alcalina, Sodio, Potasio, Cloro, Urea, T4 total, SDMA, Bilirrubina total, Ratio S

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y suero (0.5 ml)

Plazo (días): 4

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Tiroides, perfil (T4 total, T4 libre y TSH específica de especie)

Instrucciones: suero(de 7 a 10 días sin tomar corticoides)

Plazo (días): 2

TLI (felina)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 7

TLI (sólo canina)

Instrucciones: 0.5ML SUERO O PLASMA

Plazo (días): 7

Tortuga básico, perfil (ácido úrico, GOT, glucosa, proteínas totales, calcio, fósforo, potasio)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Tos de las perreras (Adenovirus Ac, Bordetella cultivo)

Instrucciones: suero e hisopo faríngeo

Plazo (días): 1

Tóxico (detección individual)

Instrucciones: Cebo, pienso, sangre EDTA, agua, orina, órganos (hígado, riñón, pulmón), contenido gástrico.
MUESTRAS CONGELADAS Y SIN FORMOL (sangre EDTA y orina refrigerados)

Plazo (días): 7

Toxicología, perfil (se detectan 1500 tóxicos)

Instrucciones: Animal vivo: sangre EDTA, contenido gástrico, orina, cebo vómito. Animal muerto: contenido gástrico, hígado, riñón, pulmón, cebo, orina, tejido adiposo. SIN FORMOL y CONGELADAS

Plazo (días): 40

Toxina Tetánica Ac

Instrucciones: 1 ml suero. Preguntar especie

Plazo (días): 20

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Toxocara (larvas) tejido

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Toxoplasma IgG grandes animales

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Treponema paraluiscliviculi Ac

Instrucciones: suero 0.5 mL

Plazo (días): 5

Treponema paraluiscliviculi PCR

Instrucciones: Hisopo sin medio de vagina/prepucio o costra

Plazo (días): 5

Trichomonas microscopio

Instrucciones: exudado genital

Plazo (días): 1

Tricograma

Instrucciones: pelo en fresco

Plazo (días): 7

Triglicéridos líquido

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Trigo/Proteínas panadería(pienso)

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Triptasa

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 5

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Tritrichomonas foetus PCR

Instrucciones: heces

Plazo (días): 4

Trombastenia de Glanzmann (GT)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Perro de montaña de los Pirineos

Trombocitopatía

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 10

Razas: Basset hound, Landseer

Trombopatía (American Eskimo Dog, Basset Hound y Landseer)

Instrucciones:

Plazo (días): 0

Razas: American Eskimo Dog, Basset Hound, Landseer

Trypanosoma evansi (tinción Giemsa)

Instrucciones: edta o heparina

Plazo (días): 1

Trypanosoma evansi PCR

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 5

Trypanosoma evansii aglutinación

Instrucciones:

Plazo (días): 10

TSH canina

Instrucciones: mín 0.1 ml suero

Plazo (días): 2

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

TSH Equina

Instrucciones: suero

Plazo (días): 7

TSH felina

Instrucciones: mín 0.1 ml suero

Plazo (días): 5

TSH OVINA

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

TTL(Test Transformacion Linfoblastica)

Instrucciones: sangre entera con heparina

Plazo (días): 12

Tuberculosis Ac (sólo primates)

Instrucciones: suero o plasma

Plazo (días): 60

Tularemia (Francisella tularensis) Ac

Instrucciones: suero

Plazo (días): 7

Turbidez (agua)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Urea alimentos

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Urea leche

Instrucciones: 30 ml leche con conservante ,1 pastilla/100ml(solicitar al laboratorio)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 5

Urea orina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Ureasa (en cepa bacteriana)

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Urigrid sistema de recogida de orina para gato

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Vacuna alergia

Instrucciones:

Plazo (días): 45

Vacuna iniciación veneno avispa (5 viales)

Instrucciones:

Plazo (días): 45

Vacuna insectos equina inicio

Instrucciones:

Plazo (días): 45

Vacunal heptavalente canino, perfil (Adenovirus canino IgG IFI (Hepatitis infecciosa canina), Leptospirosis IgG (IFI), Parvovirus canino IgG, Moquillo IgG)

Instrucciones: suero 1 ml

Plazo (días): 1

Variante de color albino

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Variante de color charcoal I

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Bengala

Variante de color gold (cobre)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: British shorthair

Variante de color gold (oro-sunshine, sunshine extremo)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Kurilian bobtail, Siberiano

Variante de color snow

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Bengala

Variante de color Tabby (mackerel, blotched)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL
Plazo (días): 15
Razas: todas las razas

Variante de color Ticked

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL
Plazo (días): 15
Razas: todas las razas

Variedad de capa copal

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso
Plazo (días): 15
Razas: Kurilian bobtail

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Variedad de capa rizada

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Selkirk rex

Variedad de capa sphynx / devon rex (SPH/DRX)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Sphynx, Devon rex

Varroosis abejas

Instrucciones: 15-30 abejas/larvas

Plazo (días): 3

Vitamina K en alimentos

Instrucciones: 100 grs

Plazo (días): 15

Viruela aviar PCR

Instrucciones: costras o lesiones cutaneas

Plazo (días): 5

Viruela mamíferos PCR (Orthopox)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 10

Virus de la cría sacciforme abejas

Instrucciones: Larvas

Plazo (días): 6

Virus de la hepatitis murina PCR

Instrucciones: Heces, Hígado, sangre con EDTA

Plazo (días): 4

Virus deformador de alas PCR abejas

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: Abejas adultas
Plazo (días): 6

Virus parálisis cronina PCR abejas

Instrucciones: Abejas adultas
Plazo (días): 6

Vitamina A en alimentos

Instrucciones: 100 grs
Plazo (días): 15

Vitamina A pienso

Instrucciones: 50 grs pienso
Plazo (días): 15

Vitamina B1 en alimentos

Instrucciones: 100 grs
Plazo (días): 15

Vitamina B12 activa Holotranscobalamina

Instrucciones: suero 1 mL
Plazo (días): 15

Vitamina B12 en alimentos

Instrucciones: 100 grs
Plazo (días): 15

Vitamina B2 en alimentos

Instrucciones: 100 grs
Plazo (días): 15

Vitamina B6

Instrucciones: plasma EDTA o suero congelado
Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Vitamina B6 en alimentos

Instrucciones: 100 grs

Plazo (días): 15

Vitamina C

Instrucciones: plasma en tubo especial, se envía protocolo junto con los tubos. Separar el plasma de edta antes de 30 minutos

Plazo (días): 17

Vitamina C en alimentos

Instrucciones: 100 grs

Plazo (días): 15

Vitamina D3 en alimentos

Instrucciones: 100 grs

Plazo (días): 15

Vitamina E (pienso)

Instrucciones: 25g pienso

Plazo (días): 20

Vitamina E en alimentos

Instrucciones: 100 grs

Plazo (días): 15

Vitaminas alimentos (cada una)

Instrucciones: alimento

Plazo (días): 7

Vitaminas-Minerales equino, perfil (Vitamina E, Ác Fólico, Vitamina B12, Calcio, Fósforo, Sodio, Potasio, Cloruros, Magnesio, Hierro, Selenio, Cobre, Zinc)

Instrucciones: Suero 3 mL

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Volumen plaquetar medio

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Vomitoxina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

von Willebrand, concentración del factor (canino)

Instrucciones: EDTA, Heparina, Suero o Citrato, 0.5 ml

Plazo (días): 3

von Willebrandt, actividad del factor de coagulación de (canino)

Instrucciones: Plasma citrato, centrifugado y congelado. Envase especial. 1 ml.

Plazo (días): 3

vWD1 (deficiencia genética del factor de von Willebrand Dobermann)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 14

WFFS (síndrome del potro débil de sangre templada)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Warmblood, Haflinger

Xantinuria tipo II

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel, Teckel, English toy terrier, Manchester terrier, Cocker spaniel inglés

XL-PRA

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Husky siberiano, Samoyedo

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Yersinia Ac

Instrucciones: 0.5 ml suero

Plazo (días): 10

Yersinia pseudotuberculosis

Instrucciones: hisopo

Plazo (días): 30

Yodo suero

Instrucciones:

Plazo (días): 10

Yoduros

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Zinc (hueso ave)

Instrucciones:

Plazo (días): 7

Zinc (pienso)

Instrucciones: 50 grs pienso

Plazo (días): 10

Zinc orina

Instrucciones:

Plazo (días): 5

ZINC PLASMA SEMINAL

Instrucciones: 1 mL plasma seminal

Plazo (días): 1

Zinc/Creatinina, ratio en orina

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Zonisamida


Instrucciones: 2 ml suero

Plazo (días): 10

Zonulina (marcador de permeabilidad intestinal)

Instrucciones: Heces refrigeradas

Plazo (días): 7



Laboratorio **Dr. Barba**

Calle Puerto Linera, 14 (28935)
Móstoles

Teléfono: 91 364 58 35

email: clientes@lbbarba.es

LABORATORIO Dr. BARBA

C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)

Tel.: 91 364 58 35

Fax: 91 365 88 21